Catálogo de tipos de Araneae (Arachnida) del Museo de La Plata

Luis A. Pereira*, Carola A. Sutton** y Martín J. Ramírez***

The spider collection of the Museum of La Plata includes the type specimens of 429 nominal species, most of them described by the Brazilian arachnologist Cándido F. de Mello-Leitão. The present catalogue is an update of previous ones published by Galiano (1980, 1981) and Arrozpide (1986), and published in complience with recommendation 72 G (4) of the International Code of Zoological Nomenclature. Historical data on the origin and organization of the collection, as well as existing problems concerning the individualization of Mello-Leitão types are commented in detail. Types are listed in alphabetical order by specific name, followed by the genus assigned in the original combination. Additional information is given for those type specimens with uncomplete, wrong or missing data. Allotypes not designated in the original descriptions and not based on the typical series are listed at the end of the catalogue.

La colección de arañas del Museo de La Plata incluye ejemplares tipo de 429 especies nominales, la mayoría de ellas descriptas por el aracnólogo brasileño Cándido F. de Mello-Leitão. El presente catálogo es una actualización de los previamente publicados por Galiano (1980, 1981) y Arrozpide (1986) y propuesto en cumplimiento con la recomendación 72 G (4) del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Datos históricos sobre el origen y organización de la colección como así también los problemas existentes en relación a la individualización de los tipos de Mello-Leitão son detalladamente comentados. Los tipos son enumerados en orden alfabético de acuerdo al nombre específico, seguido por el género asignado en la combinación original. Se brinda información adicional sobre los ejemplares tipo con datos incompletos, erróneos o faltantes. Los alotipos no designados en las descripciones originales y no basados en las series tipo son enumerados al final del catálogo.

Introducción

En la colección de arácnidos del Museo de La Plata están depositados los tipos de 429 especies nominales de arañas. El 95 % (408) fueron descriptas por el aracnólogo brasileño Cándido F. de Mello-Leitão, y el resto por Birabén, González y Castro, Prosen, Canals e Ibarra-Grasso.

Este trabajo es una revisión y actualización de los catálogos realizados por Arrozpide (1986) y Galiano (1980, 1981) sin los cuales la concreción del presente hubiera sido una tarea muy tediosa. Como aquellos, da cumplimiento a lo recomendado por el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica que en su recomendación 72 G (4) de la tercera edición

^{*} Jefe de Sección Aracnología y Miriapodología. Depto. Científico Zoología Invertebrados, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n. 1900 La Plata, Argentina.

^{**} Jefe Departamento Científico Zoología Invertebrados, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n. 1900 La Plata, Argentina.

^{***} Laboratorio de Artrópodos, Departamento de Biología, FCEyN, UBA. Pabellón II Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires, Argentina, y Museo Argentino de Ciencias Naturales, Av. Angel Gallardo 470, 1405 Buenos Aires.

(1985) sugiere la publicación de listados completos del material tipo depositado en las instituciones.

La individualización de algunos de los tipos de Mello-Leitao, presenta ciertos problemas. Como destaca Galiano (1980), este autor no siempre especificaba si el tipo designado provenía de una serie o si era ejemplar único, y además los datos de las etiquetas suelen tener diferencias con los publicados.

Muchas incongruencias podrían tener origen en el modo en que los manuscritos de Mello-Leitao se realizaban. Según Galiano (com. pers.), Birabén enviaba las arañas a Mello-Leitao, a Río de Janeiro. Este las estudiaba, y devolvía el material junto con un manuscrito. Birabén se encargaba de la traducción, asignaba números a los ejemplares, y agregaba estos datos al manuscrito. Algunas de las incongruencias podrían deberse a esta parte del trabajo, que no fue realizada por el autor. Por lo general, los paratipos designados no fueron etiquetados como tales, mientras que varios ejemplares fueron etiquetados como "paratipo" sin que fueran designados en la publicación original.

Otros problemas tal vez hayan surgido por la organización de la colección hecha por su primer curador, el Dr. Max Birabén. Al parecer, este autor separó parte de los ejemplares estudiados por Mello-Leitáo, para incluirlos en su colección personal, que guardaba en su casa. Varios de esos ejemplares están etiquetados como "tipo" o "paratipo". Al retiro de Birabén, su colección pasó al Museo de La Plata, pero solamente algunos de los ejemplares típicos fueron identificados por Arrozpide e incluidos en su catálogo (1986).

Mello-Leitáo no devolvió la totalidad de los ejemplares estudiados, porque en la colección del Museu Nacional de Rio de Janeiro se encontraron algunos especímenes que por las etiquetas son seguramente sintipos, y que debieron ser depositados en el Museo de La Plata. Posiblemente resten encontrarse algunos ejemplares adicionales en estas condiciones en Rio de Janeiro.

El resto de la colección permaneció en el Museo de La Plata, y los tubos de los tipos estaban en los mismos frascos que el material no típico. Arrozpide se encargó de identificar y separar los tipos del resto de la colección (Galiano, com. pers.). De esta manera, la colección estaba organizada en tres grupos:

a) Tipos: los ejemplares que figuran en el catálogo

de Arrozpide (1986).

- **b)** Ejemplares no típicos, determinados por Mello-Leitáo y publicados en sus trabajos.
- c) Colección Birabén: ejemplares de los dos grupos anteriores, que fueron presumiblemente apartados por Birabén para formar parte de su colección personal. Birabén además depositaba los tipos de sus especies en su colección personal.

Teniendo en cuenta las numerosas incongruencias entre los datos publicados y las etiquetas, la identificación de los tipos es muchas veces materia opinable, y dependerá del criterio del revisor especialista en el grupo. Nuestra intención es presentar todos los datos disponibles de los especímenes, con la menor cantidad posible de interpretaciones subjetivas sobre su status de tipo, poniendo a disposición de los investigadores todos los especímenes presumiblemente típicos. En los casos dudosos, cada especialista deberá establecer la condición de los ejemplares, y hacer las designaciones necesarias en las revisiones correspondientes. Los casos dudosos son muchos, y seguramente varias de las identificaciones de este catálogo deban ser revisadas.

Todos los ejemplares aquí incluidos están apartados en una colección de tipos, y no se han reemplazado las etiquetas originales. Los restantes ejemplares estudiados por Mello-Leitao y Birabén se han dejado aparte, sin mezclarse con material más reciente.

Los tipos están ordenados alfabéticamente por nombre específico seguidos por el género del binomio original, según el siguiente formato: nombre específico, género [binomio original] autor, cita de publicación original. Ejemplar/es, número en la colección del MLP (detalle de designaciones posteriores). Procedencia, fecha y colector (según la etiqueta que acompaña al ejemplar).

OBSERVACIONES: son datos adicionales, contradictorios, confusos o faltantes. Cuando la etiqueta difiere de la localidad citada en la publicación original, se detalla en "OBSERVACIONES".

Se han omitido combinaciones distintas de la original o sinonimias. Los únicos datos posteriores a la publicación original que se incluyen son los que afectan el status de los tipos (como designación de lectotipos), o agregan información para su reconocimiento. Se utilizó el término holotipo solamente cuando lo estableció el autor de la especie o algún revisor posterior.

En ciertos casos Mello-Leitáo y Birabén designaron alotipos de especies descriptas en

trabajos anteriores, incluso de otros autores. Al no estar incluidas en la publicación original de la especie, no forman parte de la serie típica; es decir, no son "tipos" en el sentido del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (artículo 72). Si bien estos alotipos no tienen valor nomenclatorial, pueden sin embargo tener algún interés taxonómico, y son incluidos al final del catálogo.

Araneae

abalosi, Argiope Mello-Leitiio, 1942: 399. Tipo ♀ 15360, Argentina: Santiago del Estero: Luján. XII-1939, Avalos leg.

Observaciones: Existe una etiqueta adicional con la siguiente inscripción: Añatuya, Santiago del Estero.

abalosi, Corinna Mello-Leitao, 1942: 416. Tipo of 15530, Argentina: Santiago del Estero: Colonia Dora. XI-1940, Abalos leg.

abalosi, Lycosa Mello-Leitao, 1942: 391. Tipo ♀ 15310, Argentina: Santiago del Estero: Colonia Dora. X-1940, Abalos Leg.

abnormis,Acanthoscurria Ibarra Grasso, 1954: 19. Tipo ♂ sin número, "Este de Bolivia". I-III-1945, W. Hanke leg.

Observaciones: El ejemplar no está etiquetado como tipo, ni tiene el número correspondiente. Tiene una etiqueta preimpresa de Ibarra Grasso, con la inscripción "*Acanthoscurria abnormissp. n.* / 1-V-54". La etiqueta original falta. Hay una copia inexacta que dice "Este de Buenos Aires? / 3-III-45 - Hacke?". Por la localidad, podría tratarse del holotipo, o de uno de los paratipos " A y "B".

adelae, *Acanthoceto* Mello-Leitao, 1944: 352. Tipo ♀ 16085, Argentina; Buenos Aires: Punta Lara. II-1941, A. Bezzi leg.

adelae, Cotinusa Mello-Leitao, 1944: 382. Tipo ♀ 16245, Argentina: Buenos Aires: Tigre: Paraná de Las Palmas. V-1941, Prosen Leg.

adelae, Misumena Mello-Leitáo, 1944: 365. Tipo ♀ 16150, Argentina: Buenos Aires: Punta Lara II-1941, Prosen Leg.

aeneus, Bianor Mello-Leitao, 1945: 279. Tipo ♂ 16730, Argentina: Corrientes: Manantiales. V-1942, Apóstol leg.

Observaciones: Estudiado por Galiano en 1963, posteriormente destruido (ver Galiano 1980: 35).

aeneus, Spinurius Mello-Leitito, 1941a: 187. Tipo d' 14989, Argentina: Tucumán: Bañado. 111-1939, M. Birabén leg.

OBSERVACIONES: Faltan los dos palpos.

aguapeyanus, Scytodes Mello-Leitao, 1945: 227. Tipo ♀ 16320, Argentina: Corrientes: Aguapey. XII-1941, M. Birabén leg.

alba,Josa Mello-Leitáo, 1945: 264. Tipo ♂ 16600, Argentina: Misiones: puerto Victoria. IV-1941, Zenzes leg.

Observaciones: En el Museu Nacional, Rio de Janeiro, se encontró un macho de la misma procedencia, etiquetado como tipo (ejemplar a ser depositado en MLP); probablemente es un sintipo.

albescenq Cotinusa Mello-Leitao, 1945: 280. Tipo ♀ 16760, Argentina: Misiones: puerto Victoria. V-1942, Zenzes leg.

albicans, Trachelopachys Mello-Leitao, 1944: 354. Tipo ♂ 16090, Argentina: Buenos Aires: Buenos Aires (Capital Federal). IV-1941, Prosen leg. Observaciones: En el mismo tubo que contiene el tipo hay un ejemplar ♀.

albiornata, Steatoda Mello-Leitito, 1940a: 36 Tipo ♀ 14330, Argentina: Río Negro: Valcheta. Sin fecha, M. Birabén leg.

albisterni, Tmarus Mello-Leitao, 1942: 410. Tipo ♀ 15470, Argentina: Santiago del Estero: Quimilí. XII-1939, M. Birabén leg.

albocincta, Epeirella Mello-Leitão, 1945: 236 Tipo ♀ 16375, Argentina: Misiones: puerto Victoria. V-1941, Zenzes leg.

albocinctus, Evophrys Mello-Leitáo, 1941a: 184. Tipo ♀ 14977, Argentina: Córdoba: Salsipuedes. 111-1939, M. Birabén leg.

albofasciatus, *Semnolius* Mello-Leitão, 1941a: 188. Tipo ♀ 14992, Argentina: Catamarca:

Andalgalá. II-1939, M. Birabén leg.

albolineatus, Uloborus Mello-Leitao,1941a: 111. Tipo ♂ 14632, (pullus), Argentina: Jujuy: Yala. 111-1939,M. Birabén leg.

Observaciones: Faltan los quelíceros y palpos.

albonotatus, Epeiroides Mello-Leitao, 1945: 237. Tipo juvenil 16380, Argentina: Misiones: puerto Victoria. V-1941, Zenzes leg.

Observaciones: Descripto como hembra adulta.

albopunctata, *Diapontia* Mello-Leitao, 1941a: 123. Tipo ♀ 14675, Argentina: Córdoba: Anisacate. I-1939, M. Birabén leg.

albotaeniata, Wixia Mello-Leitáo, 1942: 403. Tipo ♀ 15410, Argentina: Chaco: Basail. XI-1939, M. Birabén leg.

albouittata, Aysha Mello-Leitao, 1944: 356. Tipo ♀ 16105, Argentina: Buenos Aires: Punta Chica. I-1941, A. Prosen leg.

albovittata, *Neosconella* Mello-Leitáo, 1941b: 214. Tipo ♀ 15150, Argentina: Santa Fe: Caraguatay. XI-1939, M. Birabén leg.

Observaciones: Hay además una etiqueta con la inscripción "El Rabón Santa Fe".

alticeps, Glieschiella Mello-Leitao, 1944: 347. 1 ♂ y 1 ♀ sintipos 16060, Argentina: Buenos Aires: San Blas. II-1941, M. Birabén leg.

Observaciones: En mal estado de conservación.

altifrons, Diestus Mello-Leitao, 1945: 260. Tipo ♂ 16575, Argentina: Misiones: Pindapoy. II-1942, Bridarolli leg.

amica, Alopecosa Mello-Leitáo, 1941a: 121. Tipo of 14670, Argentina: Córdoba: Anisacate. I-1939, M. Birabén leg.

amica, Itatiaya Mello-Leitao, 1941a: 159. Tipo ♂ 14832, Argentina: Tucumán: Clavillo. III-1939, M. Birabén leg.

ampascachi, Theridion Mello-Leitao, 1941a: 144. Tipo ♀ 14775, Argentina: Salta: Ampascachi. Sin fecha, M. Birabén leg.

amplexa, Micrathena Mello-Leitão, 1944: 332.

Tipo 15975, Argentina: Buenos Aires: Tigre. IV-1941, A. Prosen leg.

angusta, Arachosia Mello-Leitao, 1944: 355. Tipo juvenil 16100, Argentina: Buenos Aires: Tigre: Guayracá. II-1941, M. Birabén leg.

anomala, Alopecosa Mello-Leitáo, 1945: 246. Tipo ♀ 16450, Argentina: Misiones: San Ignacio. XII-1941, M. Birabén leg.

anomalus, *Bacillocnemis* Mello-Leitao, 1938: 105. Tipo ♀ 14127, Argentina: Buenos Aires: Orense. Sin fecha ni colector.

a-notata, Evophrys Mello-Leitao, 1940a: 55. Tipo ♀ 14385, Argentina: Río Negro: aguada Cecilio y lago Mascardi. II-1938, M. Birabén leg.

apostoli, Paracleocnemis Mello-Leitao, 1945: 269. Tipo ♂ 16625, Argentina: Corrientes: Manantiales. V-1942, Apóstol leg.

apostoli, Theridion Mello-Leitáo, 1945: 234. Tipo ♀ 16355, Argentina: Corrientes: Mburucuyá. Sin fecha, Apóstol leg.

argentina, Castianeira Mello-Leitao, 1942: 414 (*Castaneira*, *lapsus*). Argentina: Santiago del Estero: Villa Unión. XI-1940, Abalos leg.

argentina, Gytha Mello-Leitáo,1944: 351. Tipo ♂ 16080, Argentina: Buenos Aires: La Plata. V-1940, M. Birabén leg.

argentina, *Orchestina* Mello-Leitáo, 1940b: 257. Tipo ♀ 15870, Argentina: Mendoza: quebrada del Toro. Sin fecha, M. Birabén leg.

argentina, Platyarachne Mello-Leitao, 1944: 371. 2 d' sintipos 16190, Argentina: Buenos Aires: Boulogne. IV-1941, Prosen leg.

argentina, *Scaphiella* Birabén, 1954a: 208. Holotipo ♀ 0330, Argentina: Salta: Prof. Salvador Mazza. 21-XII-1951,M. Birabén leg.

argentina, *Simprulla* Mello-Leitao, 1940b: 256. Tipo ♀ 15860, Argentina: Córdoba: Mina Clavero. I-1940, M. Birabén leg.

argentina, Tama Mello-Leitão, 1942: 398. Sintipo

♀ 15355, Argentina: Santiago del Estero: Campo del Cielo. XI-1940, Abalos leg. Sintipo ♂ 15356, Argentina: Santiago del Estero: Villa Unión. XI-1940, Abalos leg.

argentinensis, Cenobiopelma Mello-Leitao, 1941a: 104. Tipo ♀ 14608, Argentina: Catamarca: Andalgalá. II-1939, M. Birabén leg.

argentinensis, Litoporus Mello-Leitao,1938: 92. Tipo ♀ 14031, Argentina: Buenos Aires: Monte Veloz. Sin fecha, C. Bruch leg.

argentinensis, *Metagonia* Mello-Leitao, 1945: 227. Tipo ♀ 16980, Argentina: Misiones: puerto Iguazú. Sin fecha, M. von Bülow leg. Observaciones: Material faltante.

argentinensis, Moenckhausiana Mello-Leitao, 1938: 99. Tipo ♀ 14077, Argentina: Neuquén: isla Tehuel Malal. Sin fecha, Lehmann-Nitzche leg.

argentinensis, **Thaumasia** Mello-Leitao, 1941b: 204. Tipo ♂ 15058, Argentina: Santa Fe: Reconquista. XI-1939, M. Birabén leg.

argentinus, Amycus Mello-Leitao, 1945: 275. Holotipo o y paratipo pullus 16690, Argentina: Corrientes: Mercedes. Sin fecha, M. Birabén leg. 5 o paratipos 16758, Argentina: Misiones: puerto Victoria. Sin fecha, Zenzes leg.

Observaciones: Junto al holotipo d se encuentra un ejemplar adicional d juvenil.

argentinus, Anisaedus Mello-Leitao,1942: 390. 1 ♂ y 1 ♀ sintipos 15303, Argentina: Santiago del Estero: Luján. XI-1940, Abalos leg.

argentinus, Conopistha Mello-Leitao, 1941a: 143. Tipo ♂ 14760, Argentina: Salta: Mojón Km 56. Sin fecha, M. Birabén leg.

argentinus, Echemus Mello-Leitao, 1940: 44 (no Mello-Leitao, 1941). Holotipo ♀ 14355, Argentina: Buenos Aires: Trenquelauquen, M. Birabén leg. Observaciones: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: puerto Belgrano, 2-II-1938, M. Birabén leg.

argentinus, Echemus Mello-Leitao, 1941a: 167 (no Mello-Leitao, 1940). Tipo ♂ 14883, Argen-

tina: Catamarca: Andalgalá. II-1939, M. Birabén leg., y seis tubos con numerosos paratipos de Salta: La Viña (14891), Río Piedras (14893); La Rioja: Nonogasta (14888); Catamarca: Hualfin (14887); Córdoba: Cabana (14372,14892).

argentinus, Nonianus Mello-Leitao, 1940a: 42. Tipo ♀ 14350, Argentina: Neuquén: San Martín de los Andes. 111-1938, M. Birabén leg.

argentinus, Ocnotelus Mello-Leitao, 1941a: 185. Tipo ♀ 14980, Argentina: La Rioja: Anillaco. II-1939, M. Birabén leg.

argentinus, Oonopinus Birabén, 1955a: 73. Probable holotipo ♂ 0280, Argentina: Catamarca: Mutquin, 12-III-1950, Birabén leg.

Observaciones: El ejemplar está etiquetado como "Oonopinus *rupicola* Birabén/Holotypus", y no tiene el número; el resto de los datos coincide, y parece ser el ejemplar ilustrado.

argentinus, Tapinillus Mello-Leitáo, 1941a: 140. Tipo juvenil 14745, Argentina: Tucumán: Tafí Viejo. 111-1939, M. Birabén leg.

argyrochrysos, Dynamius Mello-Leitao, 1946: 23 (*Dinamius*, lapsus). 2 ♀ sintipos 17020, Paraguay: Puerto Pinasco. I-1943, M. von Bülow leg.

argyroides, Tetragnatha Mello-Leitao, 1945: 243. Tipo ♂ 16420, Argentina: Misiones: Pindapoy. XII-1941, M. Birabén leg.

asuncionis, **Amaurobius** Mello-Leitao, 1946: 17. Tipo ♀ 17000, Paraguay: Asunción. I-1943, M. von Bülow leg.

athleticus, Petricus Mello-Leitao, 1944: 369. 1 ♂ y 1 ♀ sintipos 16180, Argentina: Buenos Aires: La Plata. XI-1939, M. Birabén leg.

aurantifemuris, Metepeira Mello-Leitao, 1942: 402. Tipo ♀ 15385, Argentina: Chaco: Tirol. XII-1939, M. Birabén leg.

aurantiovittata, Akela Mello-Leitao, 1945: 272. Varios ejemplares, probablemente sintipos 16650, Argentina: Misiones: puerto Victoria. VI-1941, Zenzes leg.

OBSERVACIONES: El autor designa solamente "tipo 9". Sin embargo, hay dos tubos con el mismo número,

dentro del mismo frasco: uno, etiquetado como "Typus", contiene $1\ \$ 2 adulta, $2\ \$ 2 juveniles y $3\ \$ 3 subadultos; otro, etiquetado como "cotipos", contiene $3\ \$ 3 adultas, $1\ \$ 3 juvenil y $2\ \$ 5 subadultos.

aurantius, Alfenus Mello-Leitao, 1945: 274. Tipo ♂ 16670, Argentina: Misiones: puerto Victoria. V-1941, Zenzes leg.

australis, Eucta Mello-Leitao, 1945: 237. Tipo ♀ 16385, Argentina: Misiones: Pindapoy. XII-1941, M. Birabén leg.

Observaciones: Ejemplar en mal estado de conservación.

australis, Sarinda Mello-Leitao, 1944: 387. Tipo juvenil 16290, Argentina: Buenos Aires: Buenos Aires (Capital Federal). 111-1941, Prosen leg. Observaciones: Faltan todas las patas y palpos. Descripta como hembra.

australis, Tmarus Mello-Leitao,1941a: 164. Tipo

[↑] 14872, Argentina: Salta: La Caldera. 111-1939, M. Birabén leg.

beltran, Lycosa Mello-Leitao, 1942: 393. Tipo ♀ 15320, Argentina: Santiago del Estero: Beltrán. XII-1939, M. Birabén leg.

bezzi, Lycosa Mello-Leitao, 1944: 343. Tipo ♂ 16040, Argentina: Buenos Aires: La Plata. II-1941, Bezzi leg.

bifasciatus, Cabanadrassus Mello-Leitao, 1941a: 166. Tipo ♂ 14880, Argentina: Córdoba: Cabana. Sin fecha, sin colector.

OBSERVACIONES: Tipo of faltante. Hay un tubo con 1 3, etiquetada como "typus", pero la descripción es claramente de un macho.

birabenae, Birabenia Mello-Leitao, 1941a: 137. Holotipo ♀ 14720, Argentina: La Rioja: Sañogasta. Alotipo ♂ 14721, Argentina: Tucumán: Bañado. II-1939, M. Birabén leg.

Observaciones: El tubo que contiene el holotipo $\ \$ se halla en un frasco madre donde se encuentran también $1\ \$ adulta y una subadulta. El autor no designa holotipo ni alotipo en su publicación, pero la hembra está etiquetada como "typus" y el macho como "alotipo".

birabeni, Anyphaena Mello-Leitao, 1944: 354.

Tipo juvenil 16095, Argentina: Buenos Aires: La Plata. XI-1940, M. Birabén leg.

Observaciones: Descripta como ?.

birabeni, Ctenus Mello-Leitiio,1941a: 157. Tipo ♀ 14822, Argentina: Salta: Juramento. 111-1939, M. Birabén leg.

birabeni, Eutichurus Mello-Leitiio, 1941a: 175. Holotipo ♂ 14935, Argentina: Córdoba: Cabana. I-1939, M. Birabén leg.

Observaciones: En el mismo tubo hay además 4 of subadultos y 2 juveniles.

birabeni, Hyltoniella Mello-Leitiio, 1940a: 29. Tipo ♂ 14320, Argentina: Río Negro: Valcheta. II-1938, M. Birabén leg.

birabeni, Leprolochus Mello-Leitao, 1942: 397. 15350. Lectotipo ♂ y 4 ♂ paralectotipos (designados por Jocqué, 1988), Argentina: Chaco: General Capdevila. Sin fecha, M. Birabén leg.

birabeni, Miagrammopes Mello-Leitao, 1945: 231. Tipo ♂ 16330, Argentina: Misiones: Pindapoy. XII-1941, M. Birabén leg.

birabeni, *Otiothops* Mello-Leitiio, 1945: 228. 1 ♂ y 1 ♀ sintipos 16325, Argentina: Corrientes:. Aguapey. XII-1941, M. Birabén leg.

Observaciones: Faltan los bulbos copuladores del macho. El frasco del macho lleva el número. El tubo de la hembra, encontrado en la colección Birabén, no lleva número, pero está etiquetado también como "tipo".

birabeni, Oxyopes Mello-Leitão, 1941b: 210. Tipo ♀ 15105, Argentina: Santa Fe: El Rabón. XI-1939, M. Birabén leg.

birabeni, Pardosa Mello-Leitiio, 1938: 94. 1 ♂ y 1 ♀ sintipos 14042, Argentina: Buenos Aires: Orense y Pehuajó respectivamente. Sin fecha ni colector.

OBSERVACIONES: Material faltante.

birabeni, Phidippus Mello-Leitao,1944: 386. 1 ♂ y 1 ♀ sintipos 16285, Argentina: Buenos Aires: Punta Lara. V-1938, M. Birabén leg.

Observaciones: También existe un ejemplar adicional (inmaduro) sin número, de la misma procedencia que la anterior y etiquetado por M.

E. Galiano como "*P. birabeni* tipo, donación de Rio de Janeiro", que puede ser un sintipo.

birabeni, Scoloderus Mello-Leitao, 1945: 242. Tipo ♀ 16415, Argentina: Misiones: puerto Victoria. V-1941, Zenzes leg.

bisignatus, Oedothorax Mello-Leitão, 1945: 234. Tipo ♂ 16630, Argentina: Misiones: puerto Victoria. 111-1941, Zenzes leg.

bivittatus, Hesydrus Mello-Leitao, 1941a: 120. Tipo juvenil 14666, Argentina: Salta: Salta (ciudad). 111-1939, M. Birabén leg.

boeroi, Freya Mello-Leitao, 1945: 281. Tipo of 16775, Argentina: Entre Ríos: Rosario del Tala. II-1942, Boero leg.

bonariensis, Diplothelopsis Mello-Leitao,1938: 89. 1 ♂ y 1 sintipos 14007, Argentina: Buenos Aires: San Blas. Sin fecha, E. Carette leg.

bonariensis, Gayenna Mello-Leitao, 1940a: 58. Tipo ♀ 14400, Argentina: Buenos Aires: Bahía Blanca, Bajo Hondo. II-1939, M. Birabén leg.

bridarolli, Lycosa Mello-Leitao, 1945: 250. Tipo ♀ 16510, Argentina: Misiones: Pindapoy. II-1942, Bridarolli leg.

bruchi, Diactenus Mello-Leitao, 1938: 103. Tipo Q 14103, Argentina: Córdoba: Cabana. Sin fecha, C. Bruch leg.

brunnea, Tymbira Mello-Leitao, 1944: 348. Tipo ♀ 16065, Argentina: Buenos Aires: Sierra Chica. II-1941, M. Birabén leg.

brunneus, *Semnolius* Mello-Leitao, 1945: 296. Tipo ♀ 16865, Argentina: Corrientes: Goya. XII-1941, M. Birabén leg.

buelowae, *Anyphaena* Mello-Leitao, 1946: 20. Tipo ♀ 17010, Paraguay: Asunción. I-1943, M. von Bülow leg.

buelowae, Castianeira Mello-Leitao, 1946: 20. Tipo d 17005, Paraguay: puerto Pinasco. I-1943, M. von Bülow leg.

buelowae, Hamataliua Mello-Leitao, 1945: 252.

Tipo \bigcirc 16985, Argentina: Misiones: puerto Iguazú. I-1943, M. von Bülow leg.

cafayate, Dictyna Mello-Leitao, 1941a: 113. Tipo ♀ 14638, Argentina: Salta: Cafayate. 111-1939, M. Birabén leg.

cancellatus, Lithyphantes Mello-Leitao, 1944: 326. Tipo ♀ 15930, Argentina: Buenos Aires: José C. Paz. Sin fecha, Rosas Costa leg.

Observaciones: En otro tubo hay 1 $^{\circ}$ de la misma procedencia, etiquetada como "paratipo"; el autor designa solamente "tipo $^{\circ}$ ".

cancroides, Polybetes Mello-Leitao, 1945: 268. Tipo ♂ 16620, Argentina: Corrientes: colonia Pellegrini-Iberá.XII-1941, M. Birabén leg.

candidissimus, Macpos Mello-Leitao, 1941b: 212. Tipo ♀ 15135, Argentina: Santa Fe: El Rabón. XI-1939, M. Birabén leg.

candidum, Chiracanthium Mello-Leitao, 1941a: 174. Tipo ♀ 14920, Argentina: Tucumán: La Cocha. 111-1939, M. Birabén leg.

canescens, Deloripa Mello-Leitao, 1944: 383. Tipo ♂ 16255, Argentina: Buenos Aires: punta Piedras. XI-1940, Rosas Costa leg.

cardinalis, Phiale Mello-Leitão, 1945: 291. Tipo ♂ 16820, Argentina: Corrientes: Goya. XII-1941, M. Birabén leg.

cardiogynus, Urozelotes Mello-Leitao, 1938: 111. Tipo ♀ 14175, Argentina: Buenos Aires: Pehuajó. Sin fecha ni colector.

carminatus, Misumenoides Mello-Leitao, 1941a: 163. Tipo ♀ 14865, Argentina: Salta: Abra Santa Laura. 111-1939, M. Birabén leg.

carmineus, Ebo Mello-Leitao, 1944: 362. Tipo ♂ 16140, Argentina: Buenos Aires: Tigre: Guayracá. 1-1940, Prosen leg.

carneus, *Misumenops* Mello-Leitao, 1944: 367. 2 3 sintipos 16165, Argentina: Buenos Aires: Punta Chica. 1-1941, Prosen leg.

caronae, *Argyrodes* González y Castro, 1996: 130.2 ♀ paratipos 17175, Brasil: Paraná: Morretes.

V-1991, Caron leg.

catamarquensis, Segestria Mello-Leitao,1941a: 192. 1 ♂ y 1 ♀ sintipos 15010, Argentina: Catamarca: Hualfin. II-1939, M. Birabén leg. Observaciones: La localidad de la etiqueta difiere

de la localidad tipo publicada: Belén, Catamarca. Hay 1 ♂ y 5 ♀ adicionales con el nº 15012 colectados en la Argentina: La Rioja: Sañogasta y etiquetados como "Segestria catamarquensis Typus".

chacoensis, Bruchnops Birabén, 1951: 62. Tipo ♀ 00130, Argentina: Chaco: Resistencia. 19-XII-1948, M. Birabén leg.

chacoensis, Lycosa Mello-Leitao, 1942: 394. Tipo 9 15330, Argentina: Chaco: Presidente de la Plaza. XI-1939, M. Birabén leg.

chloroticus, Origes Mello-Leitao, 1945: 266. Tipo ♂ 16615, Argentina: Corrientes: Mburucuyú. X-1941, Apóstol leg.

cincta, Phiale Mello-Leitiio, 1942: 420. Tipo ♂ 15570, Argentina: Santiago del Estero: Nasaló. XII-1939, M. Birabén leg.

cinerea, Cetonana Mello-Leitao, 1941b: 221. Tipo & 15270, Argentina: Santa Fe: Reconquista. XI-1939, M. Birabén leg.

cinerea, Mastophora Mello-Leitao, 1943: 105. Tipo ♀ 15650, Argentina: Córdoba: Cabana.1-1940, M. Birabén leg.

OBSERVACIONES: En mal estado de conservación.

cinereovittata, Aysha Mello-Leitão, 1945: 262. Tipo ♂ 16585, Argentina: Misiones: puerto Victoria. IV-1941, Zenzes leg.

Observaciones: En la colección Birabén se encontró otro macho de la misma procedencia y colector, etiquetado como "paratipo", sin número. El autor no designó paratipos.

cinereus, Mago Mello-Leitiio, 1945: 287. Tipo d 16795, Argentina: Misiones: puerto Victoria. V-1941, Zenzes leg.

OBSERVACIONES: Existe un ejemplar adicional od adulto, sin número, de la misma procedencia que el anterior y etiquetado por M. E. Galiano como "Mago cinereus" typus, donación de Rio de Ja-

neiro". Podría ser un sintipo.

claveroensis, Castianeira Mello-Leitiio, 1943: 114. Tipo ♀ 15778, Argentina: Córdoba: Mina Clavero. II-1940, M. Birabén leg.

coccineus, Axyracrus Mello-Leitao, 1943: 116. Tipo ♀ 15800, Argentina: Córdoba: Bajo Grande. I-1940, M. Birabén leg.

Observaciones: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: Córdoba (ciudad).

conus, *Argyrodes* González y Castro, 1966: 136. Holotipo ♀ 17180, Argentina: Misiones: arroyo Yacui y ruta 101. VII-1987, A. González leg.

cordobensis, Teudis Mello-Leitiio, 1941a: 195. Tipo ♀ 15035, Argentina: Córdoba: Cabana. I-1939, M. Birabén leg.

Observaciones: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: Alta Gracia.

corondaensis, Pardosa Mello-Leitiio, 1941b: 209. Tipo ♀ 15092, Argentina: Santa Fe: Coronda. XI-1939, M. Birabén, leg.

correntinus, *Scotophaeus* Mello-Leitiio, 1945: 258. Tipo ♀ 16565, Argentina: Corrientes: Goya. XII-1941, M. Birabén Leg.

Observaciones: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: Santiago Alcorta.

corticinus, Petricus Mello-Leitiio, 1944: 370. Tipo ♀ 16185, Argentina: Buenos Aires: La Plata. X-1937, J. A. Rosas Costa Leg.

cosquin, Lycosa Mello-Leitao, 1941a: 126. Tipo ♀ 14683, Argentina: Córdoba: Cosquín. II-1939, M. Birabén leg.

costulata, Ceto Mello-Leitao, 1940a: 52. Tipo d' 14375, Argentina: Chubut: Comodoro Rivadavia. II-1938, M. Birabén leg.

Observaciones: Según el autor es un ejemplar inmaduro.

costulatus, Hurius Mello-Leitao,1944: 384. Tipo ♀ 16265, Argentina: Buenos Aires: punta Piedras. V-1937, Rosas Costa leg.

cothurnatus, Amaurobius Mello-Leitao, 1943: 102. Tipo ♂ 15620, Argentina: Córdoba: Alta Gracia. I-1941, C. Bruch leg.

cribrosa, Corinna Mello-Leitiio, 1942: 417. Tipo ♀ 15540, Argentina: Chaco: Resistencia. XI-1939, M. Birabén leg.

crispus, Auximus Mello-Leitão, 1941a: 117. 1 ♂ y 1 ♀ sintipos 14655, Argentina: La Rioja: Castro Barros. I-1939, C. Bruch leg.

Observaciones: Existe una etiqueta con la siguiente inscripción: Córdoba.

ctenops, Catuna Mello-Leitao, 1940b: 253. Tipo d 15820, Argentina: La Rioja: Catuna. II-1940, M. Birabén leg.

decemguttata, Thaumasia Mello-Leitiio, 1945: 245. Tipo ♀ 16440, Argentina: Corrientes: Curuzú Cuatiá. XI-1941, M. Birabén leg.

delicata, *Suaruna* Mello-Leitao, 1945: 298. Tipo ♀ 16870, Argentina: Misiones: puerto Victoria. V-1941, Zenzes leg.

delineata, Metepeira Mello-Leitão, 1943: 105. Tipo ♀ 15660, Argentina: Córdoba: Cabana. I-1940, M. Birabén leg.

difficilis, Paranesticus Mello-Leitiio,1944: 333. Tipo ♀ 15980, Argentina: Buenos Aires: General Guido. II-1941, M. Birabén leg.

Observaciones: Se encontró 1° en el Museu Nacional, Rio de Janeiro, identificada como tipo (ejemplar a ser depositado en MLP). Es probablemente un sintipo.

diffusa, Opsaltella Mello-Leitao, 1941a: 115. Tipo ♀ 14645, Argentina: Salta: Salta (ciudad). III-1939, M. Birabén leg.

dissimilis, Sassacus Mello-Leitiio, 1941a: 186. Lectotipo ♂ y paralectotipo 3 (designados por Galiano, 1981), 14987, Argentina: Tucumán, Clavillo.111-1939,M. Birabén leg.

Observaciones: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: La Rioja, Chilecito, Bajo de Doria.

distinctus, Trachelas Mello-Leitiio, 1941a: 178. Tipo ♀ 14952, Argentina: Jujuy: Yala. 111-1939, M. Birabén leg.

dorae, Clynotoides Mello-Leitiio, 1944: 381. Tipo ♀ sin número, Argentina: Buenos Aires: Tandil. Sin fecha, Prosen leg.

Observaciones: Solamente existe 1 ♂ sin número, que según Galiano (1980: 36) no es el tipo.

dorae, Thysema Mello-Leitiio, 1944: 390. Tipo ♀ 16300, Argentina: Buenos Aires: Tigre, Guayracá. 111-1941, Prosen leg.

duodecempunctatus, Dendryphantes Mello-Leitão, 1943: 120 (D. 12-punctatus). Tipo ? 15850, Argentina: Mendoza: Pareditas. II-1940, M. Birabén leg.

duplovittata, Gayenna Mello-Leitiio,1942: 422. Tipo juvenil 15580, Argentina: Santiago del Estero: Villa Unión. XI-1940, Abalos leg.

elongata, Cetonana Mello-Leitao, 1943: 114. Tipo ♀ 15780, Argentina: Córdoba: Rayo Cortado. XII-1940,R. Maldonado Bruzzone leg.

enigmaticus, Quemedice Mello-Leitiio, 1942: 407. Tipo ♀ 15450, Argentina: Santiago del Estero: Puna. XII-1939, M. Birabén leg.

exigua, Gayenna Mello-Leitiio, 1940a: 58. Tipo ♂ 14404, Argentina: Río Negro: Bariloche. 111-1938, M. Birabén leg.

eximius, Misumenoides Mello-Leitiio, 1938: 106. Tipo d 14139, Argentina: Buenos Aires: San Blas. Sin fecha, E. Carette leg.

extraordinarius, Bredops Mello-Leitiio, 1944: 378. Tipo & 16225, Argentina: Buenos Aires: Tandil. IV-1941, Prosen leg.

farhati, *Nops* Prosen, 1949: 321. Holotipo ♂, Argentina: Santiago del Estero, Campo Gallo. III-1943, A. Prosen y J. Farhat leg.

OBSERVACIONES: Aunque el ejemplar no fue etiquetado como tipo, los datos y las ilustraciones se corresponden con el ejemplar.

farinosa, Neosconella Mello-Leitao, 1941a: 152. Tipo ♀ 14800, Argentina: Salta: Mojotoro. 111-1939, M. Birabén leg.

fasciatus, *Trachelopachys* Mello-Leitao, 1941a: 178. 3 ♀ sintipos 14957, Argentina: Córdoba:

Cabana. 1-1939, M. Birabén leg.

fatua, *Osoriella* Mello-Leitão, 1942: 423. Tipo ♂ 15585, Argentina: Santiago del Estero: colonia Dora. XI-1940, Abalos leg.

Observaciones: Publicado como hembra, aunque la descripción y las ilustraciones son claramente del macho, y se corresponden con el ejemplar.

ferruginea, Phiale Mello-Leitao, 1944: 386. Tipo 3 16280, Argentina: Buenos Aires: Tigre: Guayracá. 111-1941, Prosen leg.

ferrugineonotata, Akela Mello-Leitáo, 1945: 273. Tipo 3 16660, Argentina: Corrientes: Goya. XII-1941, M. Birabén leg.

filixnotata, Philisca Mello-Leitao, 1938: 115. Tipo ♀ 14220, Argentina: Buenos Aires: Monte Veloz. Sin fecha, C. Bruch leg.

fimbriata, Agalenocosa Mello-Leitiio, 1944: 336. Tipo ♀ 15995, Argentina: Buenos Aires: Arrecifes. I-1941, M. Birabén leg.

fissifasciata, Wixia Mello-Leitao, 1945: 244. Tipo ♀ 16430, Argentina: Misiones: Pindapoy. II-1942, Bridarolli leg.

Observaciones: En mal estado de conservación.

flammula, Pardosa Mello-Leitao, 1945: 251. Tipo ♂ 16520, Argentina: Entre Ríos: Rosario del Tala. V-1941, Boero leg.

foestiva, Stenodeza Mello-Leitão, 1944: 389. Tipo of 16295, Argentina: Buenos Aires: Tigre. IV-1941, Prosen leg.

foliatus, Latrodectus Mello-Leitao, 1940a: 35. Tipo '3 14325, Argentina: Buenos Aires: Juárez. I-1938, M. Birabén leg.

Observaciones: Falta el alotipo ♂ 14326.

fragile, Anisacate Mello-Leitao, 1941a: 114. Tipo ♀ 14640, Argentina: Córdoba: Anisacate. I-1939, M. Birabén leg.

fuscus, Ebo Mello-Leitão, 1943: 118. Tipo ♀ 15830, Argentina: La Rioja: Castro Barros.111-1940, M. Birabén leg.

gallinii, Acentroscelus Mello-Leitao, 1943: 117.

Tipo ♀ 15810, Argentina: Córdoba: Maquinista Gallini. I-1940, M. Birabén leg.

gallopavo, Lycosa Mello-Leitão, 1941b: 205. Tipo a" 15065, Argentina: Santa Fe: Vera. XI-1939, M. Birabén leg.

OBSERVACIONES: Material faltante.

gastrotaeniatus, Teudis Mello-Leitao,1944: 359. Tipo ♀ 16120, Argentina: Buenos Aires: Punta Chica. I-1941, A. Prosen leg.

gentilis, Agalenocosa Mello-Leitiio, 1944: 336. Tipo ♀ 16000, Argentina: Buenos Aires: Tigre. I-1941, Prosen leg.

gerschmanae, Misumenoides Mello-Leitao, 1944: 365. Tipo ♀ 16155, Argentina: Buenos Aires: Tigre, Guayracá. I-1941, Prosen leg.

giganteus, Echemoides Mello-Leitao, 1938: 112. Tipo a" 14179, Argentina: Mendoza: Chacras de Coria. Sin fecha, Jorgensen leg.

glabra, Pardosa Mello-Leitáo, 1938: 95. Tipo juvenil 14045, Argentina: Córdoba: Cabana. Sin fecha, M. Birabén leg.

guadalupei, Ctenus Mello-Leitao, 1941b: 215. Tipo ♀ 15180, Argentina: Santa Fe: Guadalupe. XI-1939, M. Birabén leg.

gulosus, Trachelopachys Mello-Leitáo, 1940a: 51. Tipo ♀ 14370, Argentina: Neuquén: alto Limay. 111-1938, M. Birabén leg.

haemorrhoa, Freya Mello-Leitao, 1945: 282. Tipo ♂ 16765, Argentina: Misiones: San Ignacio. XII-1941, M. Birabén leg.

haplogyna, Matidia Mello-Leitao, 1945: 261. Tipo ♀ 16580, Argentina: Corrientes: Santiago Alcorta. XII-1941, M. Birabén leg.

Observaciones: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: Corrientes, Goya.

baywardi, Mastophora Birabén,1946: 327. Tipo ♀ 17060, Argentina: Tucumán: Tucumán. Sin fecha, K. Hayward leg.

hebraicus, Selenops Mello-Leitao, 1945: 270.

Tipo \bigcirc 16630, Argentina: Misiones: puerto Victoria. IV-1941, Zenzes leg.

hieroglyphicus, Lyssomanes Mello-Leitáo, 1944: 371. Tipo ♀ 16881, Argentina: Buenos Aires: Punta Lara. 111-1940, M. Birabén leg.

hirsuta, Agelista Mello-Leitáo, 1941a: 179. Lectotipo d y paralectotipo ♀ 14962 (designados por Galiano 1980), Argentina: Catamarca: Belén. II-1939, M. Birabén leg.

OBSERVACIONES: En el tubo de los ejemplares lectoy paralectotipo hay además una etiqueta con el número 14963. En otro frasco están los tubos 14964, 14966-68 detallados por Galiano (1980: 34), que podrían ser paralectotipos.

hirsuta, Aysha Mello-Leitáo, 1942: 421. Tipo d 15575, Argentina: Santiago del Estero: Atamisqui. XI-1940, Abalos leg.

hirsuta, Eustala Mello-Leitao, 1942: 400. Tipo d 15370, Argentina: Chaco: Tirol. XII-1939, M. Birabén leg.

hirsutipedis, Idiops Mello-Leitáo, 1941a: 100. Tipo '3 14600, Argentina: La Rioja: Castro Barros. II-1939, M. Birabén leg.

holmbergi, Segestria Mello-Leitáo, 1944: 322. Tipo ♂ 15905, Argentina: Buenos Aires: La Plata. IV-1940, M. Birabén leg.

humeratus, Polybetes Mello-Leitáo, 1941b: 216. Tipo ♀ 15207, Argentina: Santa Fe: Caraguatay. Sin fecha, M. Birabén leg.

humilis,Alopecosa Mello-Leitao,1944: 338. Tipo ♂ 16015, Argentina: Buenos Aires: Tigre, Guayracá. 1-1941, Prosen leg.

humilis, Asthenoctenus Mello-Leitao, 1942: 404. Tipo ♀ 15415, Argentina: Santiago del Estero: Colonia Dora. XI-1940, Abalos leg.

hyltonae, *Ceto* Mello-Leitáo, 1940a: 53. Tipo ♀ 14380, Argentina: Chubut: Comodoro Rivadavia. II-1938, M. Birabén leg.

byltonscottae, Lycosa Mello-Leitáo, 1941a: 126. Tipo ♀ 14685, Argentina: Córdoba: Anisacate. I-1939, M. Birabén leg. *iguazuensis, Argyrodes* González y Castro, 1996: 131. Holotipo ♂ 17176, Argentina: Misiones: cataratas del Iguazú. 111-1988, A. González leg.

illudens, Amaurobius Mello-Leitáo, 1940a: 17. Holotipo ♀ 14294, Argentina: Río Negro: lago Moreno. 111-1938, M. Birabén leg.

Observaciones: Falta el alotipo d' 14295. En la colección Birabén se encontró una hembra sin procedencia con una etiqueta "Amaurobious illudens tipo".

imitans, Amaurobius Mello-Leitáo, 1940a: 15. Tipo ♂ 14290, Argentina: La Pampa: Puelches. III-1938, M. Birabén leg.

impudica, Lycosa Mello-Leitáo,1944: 344. Tipo ♀ 16045, Argentina: Buenos Aires: Médanos. II-1941, M. Birabén leg.

incertula, Lycosa Mello-Leitáo,1941a: 127. Tipo ♀ 14688, Argentina:Jujuy: Yala. II-1939, M. Birabén leg.

indefinida, Lycosa Mello-Leitáo, 1941b: 207. Tipo ♂ 15070, Argentina: Santa Fe: Reconquista. XI-1941, M. Birabén leg.

indistincta, *Argiope* Mello-Leitáo, 1944: 328. Tipo ♂ 15945, Argentina: Buenos Aires: José C. Paz. IV-1941, Rosas Costa leg.

inermis, Grammostola Mello-Leitáo, 1941a: 101. Tipo ♂ 14605, Argentina: Catamarca: Belén. II-1939, M. Birabén leg.

infausta, Diapontia Mello-Leitáo, 1941a: 124. Probable tipo ♀ 14676, Argentina: Córdoba: Río Segundo. Sin fecha ni colector.

OBSERVACIONES: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: San Marcos, Córdoba. También se designó un paratipo de Río Segundo. El ejemplar tiene el número del tipo y la procedencia del paratipo.

infranotata, Semora Mello-Leitáo, 1945: 296. Tipo \bigcirc 16855, Argentina: Corrientes: Aguapey. XII-1941, M. Birabén leg.

insulata, Lycosa Mello-Leitáo, 1944: 345. 1 ♂ y 1 ♀ sintipos 16050 y 16051, Argentina: Buenos Aires: Tigre, isla canal Arias. XI-1940, M. Birabén leg.

intermedia, Mastophora Mello-Leitao, 1945: 240. Tipo ♀ 16400, Argentina: Misiones: Pindapoy. II-1942, Bridarolli leg.

intermedia, Sanogasta Mello-Leitáo, 1941a: 177. Tipo ♀ 14948, Argentina: La Rioja: Sañogasta. II-1939, M. Birabén leg.

Observaciones: En la colección Birabén se encontró una hembra sin procedencia, con etiqueta "Sanogasta intermedia/Tipi".

irregularis, Gophoa Mello-Leitao, 1945: 285. Tipo ♂ 16780, Argentina: Corrientes: Goya. XII-1941, M. Birabén leg.

Observaciones: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: Corrientes, Santiago Alcorta.

irregularis, Thomisoides Mello-Leitao, 1940a: 9. Tipo ♀ 14270, Argentina: Neuquén: Arroyito. 111-1938, M. Birabén leg.

isophthalma, *Hahnia* Mello-Leitao, 1941a: 193. 1 ♀ inmadura y 1 ♂ subadulto sintipos, 15015, Argentina: La Rioja: Chilecito, Bajo Doria. II-1939, M. Birabén leg.

Observaciones: Mello-Leitao solamente nombra a la hembra, pero la fotografía que presenta es la del macho subadulto.

jujuyensis, Asthenoctenus Mello-Leitao, 1941a: 156. Tipo ♀ 14820, Argentina: Jujuy: Yala. 111-1939, M. Birabén leg.

lactea, Eustala Mello-Leitao, 1944: 329. 4 ♂ sintipos 15950, Argentina: Buenos Aires: Tigre. IV-1941, Prosen leg.

lactea, Mangora Mello-Leitao, 1944: 331. Tipo ♀ 15965, Argentina: Buenos Aires: La Plata. Los Talas. V-1941, A. F. Gutiérrez leg.

lacteovittatus, Faiditus Mello-Leitao,1945: 233. Tipo ♀ 16350, Argentina: Misiones: puerto Victoria. Sin fecha, Zenzes leg.

lacticeps, Metadiaea Mello-Leitáo, 1944: 363. Tipo ♀ 16145, Argentina: Buenos Aires: Tandil. II-1941, Prosen leg.

lageniferus, Teudis Mello-Leitáo, 1944: 360. Tipo ♀ 16125, Argentina: Buenos Aires: Tigre, Guayracá. II-1941, A. Prosen leg.

lancearia, Lycosa Mello-Leitao, 1940a: 24. Tipo ♂ 14310, Argentina: Chubut: Ñorquinco. II-1938, M. Birabén leg.

laraensis, Argyrodes González y Castro, 1996: 131. Holotipo ♀ 17177, Argentina: Buenos Aires: Punta Lara. II-1982, A. Gónzález leg.

leucogastra, Lycosa Mello-Leitao, 1944: 346. Tipo [♀] 16055, Argentina: Buenos Aires: Sierra de la Ventana. II-1941, M. Birabén leg.

Observaciones: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: Buenos Aires, La Plata.

leucophthalma, Lycosa Mello-Leitão, 1940a: 25. Tipo ♀ 14312, Argentina: Río Negro: Bariloche. III-1938, M. Birabén leg.

leucoprocta, Cerionesta Mello-Leitao, 1944: 380. Tipo ♂ 16235, Argentina: Buenos Aires: Brandsen. I-1941, M. Birabén leg.

leucostigma, Azilia Mello-Leitao, 1941a: 155. Tipo ♂ 14808, Argentina: Salta: Salta.111-1939, M. Birabén leg.

lineata, Amerotritte Mello-Leitao, 1944: 375. Tipo juvenil 16210, Argentina: Buenos Aires: Tigre, Guayracá. IV-1941, Prosen leg.

Observaciones: Publicado como hembra. Examinado por Galiano (1980: 34); dañado posteriormente: sólo queda el prosoma.

lineata, Semorina Mello-Leitao, 1945: 298. Tipo ♀ 16860, Argentina: Misiones: Pindapoy. II-1942, Bridarolli leg.

Observaciones: epigino en preparación microscópica, debidamente rotulada y con el mismo número.

lineolata, Trachelas Mello-Leitáo, 1938: 118. Tipo ♀ 14247, Argentina: Buenos Aires: La Plata, Río Santiago. VII-1915, M. Birabén leg.

lissopalpus, Cetonana Mello-Leitão, 1943: 116. Tipo ♂ 15790, Argentina: Mendoza: río Atuel. II-1940, M. Birabén leg.

OBSERVACIONES: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: Mendoza, Los Molles.

livida, Metazygia Mello-Leitao, 1941a: 151. Tipo ♀ 14798, Argentina: La Rioja: Gobernador Gordillo. Sin fecha, M. Birabén leg.

longidens, Tetragnatha Mello-Leitao, 1945: 244. Tipo ♂ 16425, Argentina: Misiones: Pindapoy. XII-1941, M. Birabén leg.

Observaciones: En el mismo tubo hay también una hembra; el autor describe solamente el macho.

longipes, Dossenus Mello-Leitão, 1941b: 203. Tipo ♀ 15050, Argentina: Santa Fe: Reconquista. XI-1939, M. Birabén leg.

lunata, Akela Mello-Leitao, 1944: 372. Tipo ♂ 16195, Argentina: Buenos Aires: Pourtalé. II-1941, M. Birabén leg.

lupus, Lyssomanes Mello-Leitao,1945: 271. Tipo ♂ 16635, Argentina: Misiones: puerto Victoria. IV-1941, Zenzes leg.

Observaciones: Existen 3 d'adicionales sin procedencia y etiquetados como "Lyssomanes lupus tipo" que posiblemente hayan pertenecido al lote original.

lurida, Wixia Mello-Leitiio, 1943: 106. Tipo ♀ 15670, Argentina: Córdoba: Alta Gracia. 1-1940, C. Bruch leg.

luteonigra, Aulonia Mello-Leitao, 1945: 247. Tipos ♂ y ♀ 16480, Argentina: Misiones: Pindapoy. Birabén leg.

Observaciones: No se encontró ningún tubo con el número 16480. En la colección Birabén se halló un tubo sin número, con un macho y una hembra identificadoscomo "cotipo" de Pindapoy, Misiones. Podrían ser sintipos.

macdonaghi, Centroctenus Mello-Leitao, 1938: 102. Tipo ♂ 14096, Argentina: Buenos Aires: San Blas. II-1932, E. Mac Donagh leg.

macrostylus, Physocyclus Mello-Leitao, 1941a: 110.2 ♂ y 1 ♀ sintipos 14630, Argentina: Tucumán: Bañado. II-1939, M. Birabén leg.

Observaciones: Todos los ejemplares están fragmentados y en mal estado de conservación. Faltan los paratipos designados por el autor en la publicaciónoriginal.

maculata, Microneta Mello-Leitao, 1940a: 37.

Tipo $^{\circ}$ 14335, Argentina: Neuquén: San Martín de los Andes. 111-1938, M. Birabén leg.

madrynensis, Dendryphantes Mello-Leitiio, 1940a: 56. Tipo ♀ 14395, Argentina: Chubut: Puerto Madryn. II-1938, M. Birabén leg.

major, Oltacloea Mello-Leitao, 1942: 404. Tipo ♀ 15420, Argentina: Santiago del Estero: Colonia Dora. XI-1940, Abalos leg.

mandibularis, Chiracanthops Mello-Leitáo, 1942: 416. Tipo ♀ 15520, Argentina: Chaco: General Capdevila. XII-1939, M. Birabén leg.

marginata, Eustala Mello-Leitáo,1942: 401. Tipo ♀ 15375, Argentina: Chaco: Tirol. XII-1939, M. Birabén leg.

mariae, *Argyrodes* González y Castro, 1996: 128. Holotipo ♀ 17170, y 2 ♂ y 1 ♀ paratipos 17171, Argentina: Misiones: puerto Iguazú. I-1992, M. Whitehouse leg.

marmoratus, Xenoctenus Mello-Leitáo,1941a: 160. Tipo ♀ 14835, Argentina: Tucumán: Bañado. II-1939, M. Birabén leg.

marmoratus, *Zelotes* Mello-Leitao, 1943: 112. Tipo ♀ 15760, Argentina: Mendoza: río Diamante. II-1940, M. Birabén leg.

martinezi, Tobias Birabén, 1955b: 73. Holotipo ♀ 0400, Bolivia: Santa Cruz: Buenavista. II-1950, A. Martínez leg.

Observaciones: El ejemplar está etiquetado como "Epicadus *martinezi* Birabén / Holotypus", y falta el número. El resto de los datos y las ilustraciones coinciden.

mastophoroides, Parawixia Mello-Leitáo, 1942: 402. Tipo ♀ 15400, Argentina: Santiago del Estero: Quimilí. XII-1939, M. Birabén leg.

melanargyra, Phiale Mello-Leitão, 1946: 27. Tipo d' 17035, Paraguay: puerto Pinasco. I-1943, M. von Bülow leg.

melanica, *Akela* Mello-Leitao,1941a: 181. Tipo ♂ 14970, Argentina: Córdoba: Anisacate. I-1939, M. Birabén leg.

melanoleuca, Mangora Mello-Leitiio, 1941a: 150.2 ♂ sintipos 14795 y 14796, Argentina:Salta: Coronel Moldes. 111-1939, M. Birabén leg.

melanoleucus, Evophrys Mello-Leitiio, 1944: 79. Tipo ♂ 16260, Argentina: Buenos Aires: Monte Veloz. X-1941, Prosen leg.

Observaciones: De este ejemplar sólo resta un fragmento de la parte dorsal anterior del prosoma.

melanomela, Asagena Mello-Leitiio,1944: 325. Tipo ♂ 15920, Argentina: Buenos Aires: Pergamino. Sin fecha, B. A. Torres leg.

melanophorus, *Zelotes* Mello-Leitiio, 1941a: 169. 1 ♂ y 1 ♀ sintipos 14895, Argentina: Tucumán: Colalao. II-1939, M. Birabén leg.

melanoprocta, Linyphia Mello-Leitáo, 1944: 328. Tipo ♀ 15940, Argentina: Buenos Aires: La Plata, IV-1940, Rosas Costa leg.

OBSERVACIONES: Material faltante.

melanostoma, Lycosa Mello-Leitáo, 1941b: 208 Tipo ♀ 15076, Argentina: Santa Fe: Reconquista. XI-1939, M. Birabén leg.

melanotaenia, *Zycosa* Mello-Leitiio,1941b: 208. Tipo ♂ 15085, Argentina: Santa Fe: Reconquista. XI-1939, M. Birabén leg.

melloi, Bruchnops Birabén, 1951: 57. Holotipo d 00120 y alotipo ♀ 00121, Argentina: Córdoba: Cabana. 15-VII-1950, M. Birabén leg.

mendocinus, Asthenoctenus Mello-Leitiio, 1943: 109. Tipo d 15730, Argentina: Mendoza: río Atuel. II-1940, M Birabén leg.

meridionalis, Ebo Mello-Leitáo,1942: 405. Tipo ♀ 15430, Argentina: Santiago del Estero: Nasaló. XII-1939, M. Birabén leg.

metamerica, Filistata Mello-Leitáo, 1940a: 7. Tipo d 14265, Argentina: Chubut: Puerto Madryn. II-1938, M. Birabén leg.

Observaciones: Ejemplar incompleto, faltan los palpos y patas I y II.

metatarsalis, Ctenus Mello-Leitáo, 1941b: 216. Tipo ♀ 15194, Argentina: Santa Fe: El Rabón. XI-1939, M. Birabén leg. *micropunctata*, *Dipoena* Mello-Leitiio, 1941a: 142. Tipo ♀ 14755, Argentina: Catamarca: La Viña. Sin fecha, M. Birabén leg.

OBSERVACIONES: Material faltante.

minima, Chirotecia Mello-Leitiio, 1943: 119. Tipo ♂ 15840, Argentina: Córdoba: Alta Gracia. I-1940, C. Bruch leg.

Observaciones: Publicado como hembra, aunque la descripción es claramente del macho. Examinado por Galiano (1980: 37).

minor, *Alopecosa* Mello-Leitáo, 1941a: 122. Tipo ♀ 14671, Argentina: La Rioja: Sañogasta. II-1939, M. Birabén leg.

Observaciones: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: La Rioja: Chilecito, Bajo de Doria.

minutus, Echemus Mello-Leitão, 1941a: 168. Tipo ♀ 14884, Argentina: Salta: Mojón Km 56. III-1939, M. Birabén leg.

misionesica, Ildibaha Mello-Leitão, 1945: 238. Tipo ♀ 16395, Argentina: Misiones: Pindapoy. II-1942, Bridarolli leg.

misionesicus, Acanthoctenus Mello-Leitão, 1945: 256. Tipo ♀ 16540, Argentina: Misiones: San Ignacio. XII-1941, M. Birabén leg.

modesta, Akela Mello-Leitáo, 1941a: 181. Probable sintipo ♂ 14971, Argentina: La Rioja: Chilecito, Bajo de Doria. 111-1939, M. Birabén leg. Observaciones: Según Galiano (1980), existe una cierta confusión con los tipos de esta especie. En la publicación original se mencionan con el № 14971 a 1 ♂ y 1 ♀ de la localidad de Chilecito, Bajo de Doria, en La Rioja, además de un número no determinado de paratipos. Actualmente queda nada más que este macho, que lleva sólo una etiqueta con el número 14971; dentro del mismo frasco hay dos etiquetas sueltas: "Tucumán, La Cocha, Birabén" (procedencia de paratipo), "Akela modesta typus", y "14973".

mojonia, Lycosa Mello-Leitiio,1941a: 128. Tipo ♂ 14690, Argentina: Salta: Mojón Km 56. 111-1939, M. Birabén leg.

morena, Anyphaena Mello-Leitiio, 1941b: 223. Tipo ♀ 15281, Argentina: Santa Fe: Calchaquí. XI-

1939, M. Birabén leg.

morenoi, Moreno Mello-Leitáo, 1940a: 47. Tipo ♀ 14365, Argentina: Buenos Aires: Tandil. XII-1938, M. Birabén leg.

Observaciones: En mal estado de conservación.

morretensis, Argyrodes González y Castro, 1996: 129. Paratipo ♀ 17174, Argentina: Misiones: cataratas del Iguazú. VII-1980 col. A. González; 4 ♀ paratipos 17172, 2 ♂ paratipos 17173, Brasil: Paraná: Morretes. IV-1991, Caron leg.

m-scripta, Gamasomorpha Birabén, 1954c: 187. Holotipo ♀ 0170, Argentina: Misiones: Oberá. XI-1948, M. Birabén leg.

Observaciones: En la colección Birabén se encontraron dos tubos adicionales, con una hembra cada uno, etiquetados como paratipos: uno con los mismos datos del holotipo, también con el número 0170; el otro de Loreto, Misones, 5-1-1933, A. Ogloblin leg., con el número 0171 (en la publicación original ese número fue asignado a un paratipo de Oberá).

mucronata, Crossopriza Mello-Leitao, 1942: 389. Tipo ♀ 15300, Argentina: Santiago del Estero. XII-1939, M. Birabén leg.

muricatus, Synstrophius Mello-Leitao, 1942: 409. Tipo ♀ 15460, Argentina: Santiago del Estero: Añatuya. X-1940, Abalos leg.

murina, Abpecosa Mello-Leitáo, 1941a: 122. Tipo ♀ 14672, Argentina: La Rioja: Anillaco. II-1939, M. Birabén leg.

musicus, **Plexippus** Mello-Leitao, 1945: 294. Tipo ♀ 16835, Argentina: Corrientes: Goya. XII-1941, M. Birabén leg.; Paratipo ♀ 16862, Argentina: Corrientes: Santiago Alcorta. Sin fecha ni colector.

mutilata, Oltacbea Mello-Leitáo, 1940a: 255. Tipo ♂ 15770, Argentina: La Rioja: Olta. II-1940, M. Birabén leg.

nanica, Pardosa Mello-Leitao, 1941b: 209. Tipo ♀ 15100, Argentina: Santa Fe: Calchaqui. XI-1939, M. Birabén leg.

nigrimanus, Saitis Mello-Leitáo, 1945: 295. Tipo

♂ 16850, Argentina: Corrientes: Goya. XII-1941, M. Birabén leg.

OBSERVACIONES: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: Corrientes, Santiago Alcorta. Faltan el opistosoma, las patas y los palpos.

nigripes, Morenilia Mello-Leitáo, 1942: 412. Tipo ♀15490, Argentina: Chaco: General Capdevila. XII-1939, M. Birabén leg.

nigrolineatus, Oxyopes Mello-Leitao, 1941a: 140. Tipo ♀ 14738, Argentina: Tucumán: Clavillo. III-1939, M. Birabén leg.

nigromaculatus, Oonops Mello-Leitiio, 1944: 323. Tipo ♀ 15910, Argentina: Buenos Aires: José C. Paz. V-1941, Rosas Costa leg.

nigronotata, Trachelas Mello-Leitão, 1938: 117. Tipo \bigcirc 14246, Argentina: Buenos Aires: San Blas. II-1932, Mac Donagh leg.

nigropunctata, Wixia Mello-Leitáo, 1941b: 214. Tipo ♀ 15170, Argentina: Santa Fe: El Rabón. XI-1939, M. Birabén leg.

nigrosecta, Balmaceda Mello-Leitáo, 1945: 277. Tipo ♂ 16710, Argentina: Misiones: puerto Victoria. VI-1943, Zenzes leg.

nigrosecta, Lycosa Mello-Leitao, 1940a: 26. 1 ♂ y 2 ♀ sintipos 14313, Argentina: Buenos Aires: Tandil. II-1938, M. Birabén leg.

nigrotaeniata, Phiale Mello-Leitáo, 1945: 292. Tipo♀ juvenil 16825, Argentina: Comentes: Goya. XII-1941, M. Birabén leg.

nigrovittatus, Cybaeodamus Mello-Leitáo, 1941a: 118. Tipo ♀ 14658, Argentina: Catamarca: Belén. II-1939, M. Birabén leg.

nitida, Hippasella Mello-Leitiio, 1944: 343. Tipo of 16035, Argentina: Buenos Aires: La Plata. XI-1940, M. Birabén leg.

niveopilosa, Lycosa Mello-Leitáo, 1938: 96. Tipo ♂ 14049, Argentina: Buenos Aires: San Blas. Sin fecha, R. Lehmann-Nitzche leg.

Observaciones: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: Neuquén, isla

Tehuel Malal.

niveosigillatus, Oxyopes Mello-Leitao, 1945: 253. Tipo ♀ 16970, Argentina: Misiones: El Dorado. I-1943, M. von Bülow leg.

Observaciones: Este material está etiquetado con el nº 16990; en tanto que en la publicación de Mello-Leitão, y en el catálogo de Arrozpide (1986) figura con el n" 16970.

niveovittata, Diapontia Mello-Leitáo, 1945: 248. Tipo ♂ 14490, Argentina: Corrientes: Curuzú Cuatiá. XI-1941, M. Birabén leg.

Observaciones: En mal estado de conservación, con abdomen, patas y pedipalpos desprendidos y fragmentados.

nobilis, Larinia Mello-Leitao, 1944: 331. Tipo ♂ 15960, Argentina: Buenos Aires: José C. Paz. X-1941, Rosas Costa leg.

nostalgicus, Tandil Mello-Leitáo,1940a: 12. Tipo ♀ 14280, Argentina: Buenos Aires: Tandil. II-1938, M. Birabén leg.

notabilis, Bruchnops Mello-Leitao, 1939: 629. Tipo ♂ 15045, Argentina: Córdoba: Alta Gracia. I-1939, C. Bruch leg.

Observaciones: El número del tipo fue asignado por Mello-Leitao (1941a: 196).

notata, Chubutia Mello-Leitão, 1940a: 4. Tipo ♂ 14260, Argentina: Chubut: Gobernador Costa. 8-III-1938, M. Birabén leg.

Observaciones: Falta el opistosoma.

novemmamillata, Eustala Mello-Leitao, 1941b: 212 (9-mamillata). Tipo ♀ 15120, Argentina: Santa Fe: El Rabón. XI-1939, M. Birabén leg.

obscura, Alopecosa Mello-Leitão, 1943: 108. Tipo ♀ 15700, Argentina: Mendoza: Los Molles. Sin fecha ni colector.

Observaciones: La etiqueta original que acompaña al material tiene la inscripción: "Río Atuel, Mendoza".

obscurus, Eustiromastix Mello-Leitao, 1942: 419. Tipo ♀ 15555, Argentina: Santiago del Estero: Beltrán. XII-1939, M. Birabén leg.

ocellifera, Parepeira Mello-Leitão, 1945: 241.

Tipo ♂ 16410, Argentina: Corrientes: Mburucuyá. II-1942, Apóstol leg.

octoguttatus, Misumenops Mello-Leitáo, 1941b: 219. Tipo ♂ 15239, Argentina: Santa Fe: Malabrigo. XI-1939,M. Birabén leg.

octomaculata, Cercidia Mello-Leitáo, 1945: 236. Tipo ♀ 16370, Argentina: Misiones: Pindapoy. I-1942, Bridarolli leg.

ornata, Trechalea Mello-Leitão, 1943: 107. Tipo ♀ 15690, Argentina: Córdoba: Bosque Alegre. I-1940, M. Birabén leg.

ornatus, Cybaeodamus Mello-Leitao, 1938: 93. Holotipo ♂ 14033, alotipo ♀ 14034, Argentina: Buenos Aires: La Plata, Río Santiago. Sin fecha, M. Birabén leg.

ornatus, Hesydrus Mello-Leitao, 1941a: 120. Tipo juvenil 14667, Argentina: Jujuy: Yala. III-1939, M. Birabén leg.

ornatus, Loxosceles Mello-Leitão, 1938: 91. Tipo ♀ 14022, Argentina: Córdoba: Cabana. I-1936, M. Birabén leg.

oserictops, Oserictops Mello-Leitão, 1941b: 222. Tipo ♂ 15275, Argentina: Santa Fe: Calchaquí. XI-1939, M. Birabén leg.

pallida, Neuquenia Mello-Leitão, 1940a: 13. Tipo ♀ 14285, Argentina: Neuquén: alto Limay. 111-1938, M. Birabén leg.

Observaciones: Falta el opistosoma.

pallidenotatus, Zelotes Mello-Leitao, 1938: 113. Tipo ♀ 14198, Argentina: Río Negro: General Roca. Sin fecha, Gaggero leg.

pallidus, Naubolus Mello-Leitao, 1945: 289. Tipo juvenil 16805, Argentina: Corrientes: Aguapey. XI-1945, M. Birabén leg.

Observaciones: Publicado como $^{\bigcirc}$; examinado por Galiano (1981).

pallidus, Philoicides Mello-Leitáo, 1944: 335. Tipo ♀ 15990, Argentina: Buenos Aires: La Plata. X-1940, J. A. Rosas Costa leg.

pallidus, Polybetes Mello-Leitao, 1941b: 217.

2 ♀ sintipos 15215, Argentina: Santa Fe: Calchaquí. XI-1939, M. Birabén leg.

pampeanus, Echemus Mello-Leitiio, 1940a: 45. Tipo ♂ 14360, Argentina: La Pampa: Puelches. III-1938, M. Birabén leg.

pampeanus, Xenoctenus Mello-Leitiio, 1940a: 39. Tipo ♂ 14340, Argentina: La Pampa: Gaviotas. II-1938, M. Birabén leg.

pantherina, Phiale Mello-Leitiio, 1946: 28. Tipo ♀ 17040, Paraguay: puerto Pinasco. I-1943, M. von Bülow leg.

pantherinus, Eustiromastix Mello-Leitiio,1942: 420. Tipo ♀ 15560, Argentina:Santiago del Estero: Asusques. XII-1939, M. Birabén leg.

parva, Nebridia Mello-Leitiio, 1945: 289. Tipo

→ 16810, Argentina: Misiones: Pindapoy. XII-1941, M. Birabén leg.

passerina, Lycosa Mello-Leitao, 1941a: 129. Tipo 3 14692, Argentina: Córdoba: Villanueva. XI-1939, **A.** Parko leg.

patagonica, Filistata Mello-Leitáo, 1938: 90. Tipo ♀ 14018, Argentina: Neuquén: isla Tehuel Malal. Sin fecha, R. Lehmann-Nitzcheleg. Observaciones: Faltan la mayoría de las patas y los palpos a partir de las tibias.

patagonicus, Xenoctenus Mello-Leitáo, 1940: 40. Tipo juvenil 14345, Argentina: Río Negro: Chelforó. 111-1938, M Birabén leg.

patquiana, Gamasomorpha Birabén, 1954c: 190. Holotipo ♂ 0240, Argentina: La Rioja: Guayapa, Patquía. XII-1951, M. Birabén leg.

paucilineata, *Gayenna* Mello-Leitiio,1945: 263. Tipo ♂ 16590, Argentina: Entre Ríos: El Palmar. XI-1941, M. Birabén leg.

pauper, Lyssomanes Mello-Leitáo, 1945: 272. 3 ♀ sintipos 16640, Argentina: Corrientes: Manantiales. IV-1942, Apóstol leg. Observaciones: Material faltante.

*pauper, Zelote*s Mello-Leitáo, 1942: 413. Tipo 3 15500, Argentina: Chaco: General Capdevila. XII-

1939, M. Birabén leg.

penicilhtus, *Echemus* Mello-Leitiio, 1942: 411. Tipo ♀ 15480, Argentina: Santiago del Estero: Simbol. XII-1939, M. Birabén leg.

penicillatus, Ilargus Mello-Leitáo, 1946: 24. Tipo ♂ 17025, Paraguay: Asunción. I-1943, M. von Bülow leg.

Observaciones: Faltan los pedipalpos.

photographica, Eustala Mello-Leitao, 1944: 329. Tipo ♀ 15955, Argentina: Buenos Aires: Punta Chica. IV-1941, Prosen leg.

pictipes, Castianeira Mello-Leitiio, 1942: 414 (*Castaneira, lapsus*). 4 ♀ y 1 ♂, probablemente sintipos 15515, Argentina: Santiago del Estero: Luján. XI-1940, Abalos leg.

Observaciones: Hay dos tubos, ambos con etiquetas de "typi". Uno tiene el número 15515 y contiene 2° ; el otro, sin número, contiene 2° y 1° .

planithoracis, Lycosa Mello-Leitao, 1938: 98. Tipo ♀ 14059, Argentina: Mendoza: Chacras de Coria. Sin fecha, Jorgensen leg.

phtensis, Gamasomorpha Birabén, 1954c: 193. Holotipo ♀ 16296, Argentina: Buenos Aires: La Plata. II-1941, Rosas Costa leg. Observaciones: Faltan los quelíceros.

plumipes, Pardosa Mello-Leitao, 1942: 395. Tipo ♂ 15345, Argentina: Chaco: Gancedo. XI-1939, M. Birabén leg.

pluripunctatus, Metaphidippus Mello-Leitiio, 1944: 385. 3 ♀ y 1 ♂ probablemente sintipos 16275, Argentina: Buenos Aires: Tandil. II-1941, Prosen leg.

OBSERVACIONES: Hay dos tubos, ambos con etiqueta de "typus": uno, con el número 16275 contiene 1 \bigcirc y 1 \otimes ; el otro, sin número, contiene 2 \bigcirc , y fue encontrado en la colección del Museu Nacional, Rio de Janeiro (Arrozpide, 1986: 47).

pourtaleensis, Diapontia Mello-Leitiio, 1944: 341. Tipo ♂ 16025, Argentina: Buenos Aires: Pourtalé. II-1941, M. Birabén leg.

praestans, Austrohahnia Mello-Leitáo, 1942:

424. 2 ♀ sintipos 15590, Argentina: Santiago del Estero: Colonia Dora. XI-1940, Abalos leg.

proletarioides, Lycosa Mello-Leitão, 1941a: 132. Tipo ♀ 14695, Argentina: La Rioja: Pinchas. II-1939, M. Birabén leg.

proseni, Aysha Mello-Leitao, 1944: 357. Lectotipo of 16110 y 1 ♀ 16110 y 1 of inmaduro 16114 paralectotipos (designados por Brescovit, 1992), Argentina: Buenos Aires: Tigre, Guayracá. II-1941, A. Prosen leg.

proseni, Gayenna Mello-Leitao, 1944: 358. Tipo '1 16115, Argentina: Buenos Aires: Tigre, Guayracá. II-1941, A. Prosen leg.

OBSERVACIONES: El autor no designa holotipo ni paratipos. La hembra tiene una etiqueta de "typus" y el número correcto. Un macho, en la colección Birabén, tiene una etiqueta de "paratipo". Se encontró también 1 ♀ en el Museu Nacional, Rio de Janeiro, identificada como tipo (ejemplar a ser depositado en MLP). Estos ejemplares probablemente deben considerarse sintipos.

proseni, Misumenoides Mello-Leitao, 1944: 366. Tipo '1 16160, Argentina: Buenos Aires: Capital Federal. I-1941, Prosen leg.

proseni, Nops Birabén, 1954b:43. Tipo ♂ 0320, Argentina: Salta: Balbuena. 12-X-1948, A. Prosen leg.

puer, Theridion Mello-Leitao, 1941b: 211. 2 ♀ sintipos 15115, Argentina: Santa Fe: Guadalupe. Sin fecha ni colector.

pugilator, Synaemops Mello-Leitao, 1941b: 219. Tipo ♂ 15245, Argentina: Santa Fe: Reconquista. XI-1939, M. Birabén leg.

punctata, Agalenocosa Mello-Leitao, 1944: 337. Sintipos 1 ♂ 16005 y 1 ♀ 16006, Argentina: Buenos Aires: La Plata. XI-1940, M. Birabén leg.

punctulatus, Polybetes Mello-Leitao, 1944: 361. Tipo ♀ 16130, Argentina: Buenos Aires: Tigre, Guayracá. II-1941, Prosen leg.

quadrifasciata, Deloripa Mello-Leitao, 1945: 280. Tipo ♀ 16760, Argentina: Corrientes: Goya.

XII-1941, M. Birabén leg.

Observaciones: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: Santiago Alcorta.

quadriguttatus, Plexippus Mello-Leitão, 1946: 29. Tipo ♀ 17045, Paraguay: puerto Pinasco. I-1943, M. von Bülow leg.

quadripunctatus, Akeloides Mello-Leitao,1944: 374. Tipo ♀ 16205, Argentina: Buenos Aires: La Plata. XI-1940, M. Birabén leg.

quimiliensis, Stephanopis Mello-Leitao, 1942: 408. Tipo ♂ 15455, Argentina: Santiago del Estero: Quirnilí. XII-1939, M. Birabén leg.

rana, Uloborus Mello-Leitao, 1941a: 112. Tipo ♀ 14635, Argentina: Salta: Coronel Moldes. III-1939, M. Birabén leg.

rastellifera, Valcheta Mello-Leitão, 1940a: 20. Tipo ♀ 14305, Argentina: Río Negro: Valcheta. III-1938, M. Birabén leg.

regius, Tobias Birabén, 1955b: 75. Holotipo ♀ 0405, Bolivia: Santa Cruz: Buena Vista, Tacú. III-1951, A. Martínez leg.

Observaciones: Etiquetado como "Epicadus regius Birabén / Holotypus", y falta el número. El resto de los datos y las ilustraciones coinciden.

restricta, Alopecosa Mello-Leitao, 1940a: 23. Tipo ♀ 14309, Argentina: Río Negro: Aguada Cecilio. 8-11-1938, M. Birabén leg.

Observaciones: En el catálogo de Arrozpide (1986) este material figura con el número MLP 14305.

retorta, Steatoda González, 1987: 179. Holotipo ${}^{\circ}$ 17010, paratipos 1 ${}^{\circ}$ 17011, 2 ${}^{\circ}$ y 5 ${}^{\circ}$ 17012, Argentina: Buenos Aires: Lima. X-1981, P. Goloboff y M. Ramírez leg.

rhodonata, Osoriella Mello-Leitao, 1946: 21. Tipo ♂ 17015, Paraguay: puerto Pinasco. 1-1943, M. von Bülow leg.

riojanus, Theratoscyrtus Mello-Leitao, 1941a: 189. Tipo ♂ 14995, Argentina: La Rioja: Anillaco. II-1939, M. Birabén leg.

OBSERVACIONES: Faltan los palpos.

robusta, Thiodina Mello-Leitao, 1945: 299. Tipo

♂ 16875, Argentina: Misiones: puerto Victoria. V-1941, Zenzes leg.

rosascostai, Cotinusa Mello-Leitao, 1944: 382. Tipo ♂ 16250, Argentina: Buenos Aires: isla Martín García. V-1935, Rosas Costa leg.

rosascostai, Euryopis Mello-Leitáo,1944: 325. Tipo ♀ 15925, Argentina: Buenos Aires: Punta Lara. Sin fecha, Rosas Costa leg.

rosea, *Agelista* Mello-Leitáo, 1941a: 180. Tipo ♀ 14965, Argentina: Salta: Salta (ciudad). 111-1939, M. Birabén leg.

rosea, Alopecosa Mello-Leitáo, 1945: 247. Tipo ♂ 16460, Argentina: Corrientes: Solari. XI-1941, M. Birabén leg.

roseofuscus, Misumenops Mello-Leitao, 1944: 367. Tipo ♀ 16170, Argentina: Buenos Aires: La Plata. XI-1940, M. Birabén leg.

roseus, Cleocnemis Mello-Leitáo, 1944: 362. Tipo ♀ 16135, Argentina: Buenos Aires: La Plata. XI-1940, M. Birabén leg.

roseus, Horioctenus Mello-Leitáo, 1941a: 158. Tipo ♂ 14828, Argentina: La Rioja: Sañogasta. II-1939, M. Birabén leg.

OBSERVACIONES: Faltan los paratipos designados por el autor en la publicación original.

roseus, Nanduti Mello-Leitao, 1945: 241. Tipo ♂ 16405, Argentina: Misiones: puerto Victoria. Sin fecha, Zenzes leg.

rubrolunatus, Ocnotelus Mello-Leitao, 1945: 291. Tipo ♀ 16815, Argentina: Misiones: puerto Victoria. V-1941, Zenzes leg.

rugosa, Trochanteria Mello-Leitao, 1938: 108. Tipo ♀ 14147, Argentina: Neuquén: isla Tehuel-Malal. Sin fecha, Lehmann-Nitzche leg.

sagitta, Lycosa Mello-Leitáo, 1941a: 133. Tipo ♀ 14698, Argentina: Córdoba: Río Tercero. I-1939, M Birabén leg.

OBSERVACIONES: Publicado como macho, aunque la descripción e ilustraciones son claramente de una hembra.

saltensis, Crossopriza Mello-Leitáo, 1941a: 109. Tipo ♀ 14625, Argentina: Salta: Santa Bárbara. III-1939, M. Birabén leg.

sanogastensis, Lycosa Mello-Leitao, 1941a: 133. Tipo ♀ 14700, Argentina: La Rioja: Sañogasta. II-1939, M. Birabén leg.

Observaciones: Junto al tipo \mathcal{P} existe otro ejemplar adicional \mathcal{P} con la identificación 14701.

schiapelliae, Misumenops Mello-Leitao, 1944: 368.2 ♂ sintipos 16175, Argentina: Buenos Aires: Guayracá. I-1941, Prosen leg.

OBSERVACIONES: Existen 2 ♂ y 2 ♀ adicionales etiquetados como "Typi", procedentes de Buenos Aires: Ingeniero Maschwitz, Prosen leg. MLP 16207.

scottae, Cybaeodamus Mello-Leitao, 1941a: 119. Tipo ♂ 14660, Argentina: La Rioja: Sañogasta. II-1939, M. Birabén leg.

scottae, Hyltonia Birabén, 1954a: 13. Holotipo ♂ 0350, Argentina: Misiones: Posadas. XII-1948, M. Birabén leg.

scottae, Rubrius Mello-Leitao, 1940a: 19. Tipo ♀ 14300, Argentina: Río Negro: lago Mascardi. III-1938, M. Birabén leg.

scutatus, Zelotes Mello-Leitao,1941a: 170. Tipo d 14896, Argentina: Jujuy: Yala. II-1939, M. Birabén leg.

secta, Breda Mello-Leitáo, 1944: 376. Tipo ♂ 16215, Argentina: Buenos Aires: Pedro Luro. II 1941, M. Birabén leg.

secta, Eustala Mello-Leitao, 1945: 328. Tipo ♀ 16390, Argentina: Misiones: puerto Victoria. V-1941, Zenzes leg.

secundus, Lycinus Mello-Leitao, 1941a: 105. Tipo ♀, Argentina:Catamarca:La Viña. M. Birabén leg.

segmentatus, *Auximus* Mello-Leitáo,1943: 103. Tipo ♂ 15630, Argentina: Córdoba: pampa de Achala. I-1940, M Birabén leg.

segmentatus, Trachelopachys Mello-Leitao, 1942: 418. Tipo d 15550, Argentina: Chaco:

Charata. XII-1939, M. Birabén leg.

semivittatus, Polybetes Mello-Leitao, 1938: 109. Tipo ♀ 14160, Argentina: Buenos Aires: Punta Lara. VI-1937, C. Bruch leg.

senescens, Capidava Mello-Leitiio, 1944: 380. Tipo ♂ 16230, Argentina: Buenos Aires: Tigre. III-1941, Prosen leg.

Observaciones: En otro tubo, dentro del mismo frasco madre, existe un d'adicional, adulto, también etiquetado como tipo.

senescens, Diapontia Mello-Leitao, 1944: 342. Tipo ♀ 16030, Argentina: Buenos Aires: General Guido. II-1941, M. Birabén leg.

Observaciones: El abdomen, patas y pedipalpos se hallan desprendidos y fragmentados y en deficiente estado de conservación.

senex, Glieschiella Mello-Leitao, 1945: 254. Tipo ♂ 16470, Argentina: Entre Ríos: Colón. XI-1941, M. Birabén leg.

Observaciones: Publicado como hembra, aunque la descripción es claramente del macho. Muy fragmentado y en deficiente estado de conservación.

sericeus, Horioctenus Mello-Leitao, 1944: 350. Tipo ♀ 16075, Argentina: Buenos Aires: Sierra de la Ventana. II-1941, M. Birabén leg.

sexguttata, Fuentes Mello-Leitao, 1945: 282. Tipo ♀ 16770, Argentina: Corrientes: Goya. XII-1941, M. Birabén leg.

Observaciones: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: Santiago Alcorta.

sexpunctata, Gastromicans Mello-Leitao,1945: 284. Tipo ♀ 16785, Argentina: Misiones: puerto Victoria. V-1941, Zenzes leg.

sigillum, Gayenna Mello-Leitáo, 1941a: 194. Tipo ♂ 15025, Argentina: Jujuy: León. 111-1939, M. Birabén leg.

simplex, Akela Mello-Leitao, 1944: 373. Tipo ♂ 16200, Argentina: Buenos Aires: José C. Paz. V-1941, J. A. Rosas Costa leg.

simplex, Naubolus Mello-Leitiio,1946: 25. 1 ♂

y 3 \circ sintipos 17030, Paraguay: puerto Pinasco. I-1943, M. von Bülow leg.

Observaciones: El macho está incompleto y en mal estado de conservación. Una de las hembras fue encontrada en la colección del Museu Nacional, Rio de Janeiro (Arrozpide, 1986: 47).

singularis, Agalenocosa Mello-Leitao, 1944: 338. Sintipos 1 ♂ 16010 y 1 ♀ 16011, Argentina: Buenos Aires: General Guido. II-1941, M. Birabén leg.

sordidus, Asthenoctenus Mello-Leitáo, 1944: 350. Tipo ♂ 16070, Argentina: Buenos Aires: La Plata. V-1940, M. Birabén leg.

sordidus, Teudis Mello-Leitiio, 1941b: 224. 2 3 y 1 ♂ sintipos 15290, Argentina: Santa Fe: Calchaquí. XI-1939, M. Birabén leg.

spinifera, Acanthomysmena Mello-Leitáo, 1944: 324. Holotipo ♂ 15915, Argentina: Buenos Aires: Escobar. Sin fecha, M. Birabén, Prosen y Rosas Costa leg.

spinimanu, Thianioides Mello-Leitao, 1941a: 190. Tipo ♂ 14999, Argentina: Córdoba: Cabana. I-1939, M. Birabén leg.

Observaciones: Galiano (1981:15) cita 1 d paratipo número 15000, que se encuentra en la colección; en la publicación original no fue designado como tal.

spinipalpi, Gnatholycosa Mello-Leitiio, 1940b: 252. Tipo ♂ 15720, Argentina: San Luis: Quines. I-1940, M. Birabén leg.

spinipalpis, Castianeira Mello-Leitiio, 1945: 259. Tipo $\$ 16570, Argentina: Misiones: San Ignacio. XII-1941, M. Birabén leg.

spinosa, Chira Mello-Leitao, 1945: 279. Sintipos $2 \$ s/n, Argentina: Misiones: puerto Victoria. Sin fecha, Zenzes leg.

spinosa, Goya Mello-Leitao, 1945: 286. Tipo ♂ 16790, Argentina: Corrientes: Goya. XII-1941, M. Birabén leg.

stenogasta, Argiope Mello-Leitao, 1945: 235. Tipo ♀ 16365, Argentina: Corrientes: Solari. XI-

1941, M. Birabén leg.

taeniata, Birabenia Mello-Leitáo, 1943: 108. Tipo ♀ 15710, Argentina: Córdoba: Bell Ville. III-1940, M. Birabén leg.

tambilloi, Filistata Mello-Leitao, 1941a: 106. Tipo ♂ 14615, Argentina: La Rioja: Tambillo. II-1939, M. Birabén leg.

Observaciones: Faltan el opistosoma y casi todas las patas.

tandilicus, *Litoporus* Mello-Leitiio,1940a: 9. 2 ♀ sintipos 14275, Argentina: Buenos Aires: Tandil. XI-1938, M. Birabén leg.

Observaciones: Uno de los ejemplares está fragmentadoy en muy mal estado de conservación. Falta el alotipo ♂ número 14276.

thoracicus, Amaurobius Mello-Leitao, 1945: 232. Tipo juvenil 16345, Argentina: Misiones: Pindapoy. XII-1941, M. Birabén leg.

tigrina, Opsaltella Mello-Leitiio, 1941a: 116. 1 ♂ y 1 ♀ sintipos 14650, Argentina: Córdoba: Cabana. I-1939, M. Birabén leg.

tigrinus, Aebutinoides Mello-Leitáo, 1943: 101. Tipo 3 15610, Argentina: Córdoba: Mina Clavero. I-1940, M. Birabén leg.

tigrinus, Asthenoctenus Mello-Leitáo, 1938: 100. Tipo ♀ 14090, Argentina: Neuquén: Tehuel Malal. Sin fecha, Lehmann-Nitzche leg.

tobioides, Petricus Mello-Leitáo, 1941a: 162. Tipo ♂ 14860, Argentina: Salta: Coronel Moldes. 111-1939, M. Birabén leg.

Observaciones: Publicado como hembra, aunque la ilustración corresponde a un macho.

trilineata, Akela Mello-Leitiio, 1941a: 182. Tipo ♀ 14972, Argentina: La Rioja: Sañogasta. II-1939, M. Birabén leg.

Observaciones: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: La Rioja, Chilecito, Bajo de Doria.

trilineata, Lauronia Mello-Leitiio, 1941a: 173. Tipo ♀ 14910, Argentina: Salta: Alemania. Sin fecha, M. Birabén leg.

tripunctatus, Tomopisthes Mello-Leitiio, 1945: 265. Tipo ♀ 6595, Argentina: Corrientes: Manantiales. Sin fecha, Apóstol leg.

tristis, Alcmena Mello-Leitiio, 1945: 274. Tipo juvenil 16680, Argentina: Corrientes: Goya. XII-1941, M. Birabén leg.

Observaciones: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: Santiago Alcorta.

tristis, *Balmaceda* Mello-Leitiio, 1945: 278. Tipo ♂ 16720, Argentina: Misiones: puerto Victoria. V-1942, Zenzes leg.

tristis, *Breda* Mello-Leitiio, 1944: 377. Tipo ♀ 16220, Argentina: Buenos Aires: Balcarce. II-1941, M. Birabén leg.

tristis, *Chrysometa* Mello-Leitiio, 1941a: 153. Tipo ♀ 14805, Argentina: Jujuy: Pampa Blanca. 111-1939, M. Birabén leg.

tristis, Evophrys Mello-Leitiio, 1940a: 56. Tipo ♀ 14395, Argentina: Neuquén: Picún Leufú. III-1938, M. Birabén leg.

tristis, *Hurius* Mello-Leitiio, 1944: 385. Tipo ♂ 16270, Argentina: Buenos Aires: La Plata. IV-1938, Rosas Costa leg.

tristis, Phiale Mello-Leitão, 1945: 293. 2 d'sintipos (1 inmaduro) 16830, Argentina: Misiones: puerto Victoria. V-1941, M. Birabén leg.

OBSERVACIONES: Galiano (1981:13) solamente estudió el macho inmaduro, que consideró como holotipo. En la descripción original figura como hembra.

tucumana, Epeirella Mello-Leitiio, 1941a: 149. Tipo juvenil 14790, Argentina: Tucumán: Tafí Viejo.111-1939, M. Birabén leg.

Observaciones: Publicado como hembra, pero es juvenil.

tucumanus, Polybetes Mello-Leitão, 1941a: 161. Tipo ♀ 14845, Argentina: Tucumán: Bañado. II-1939, Bruch leg.

OBSERVACIONES: Material faltante.

tucumanus, Zelotes Mello-Leitáo, 1941a: 171.

Tipo ♂ 14897, Argentina: Tucumán: La Cocha. III-1939, M. Birabén, leg.

Observaciones: Faltan los palpos.

u-album, Lycosa Mello-Leitao, 1938: 97. Tipo ♀ 14050, Argentina: Buenos Aires: Pehuajó. Sin colector ni fecha:

uncinatus, Echemoides Mello-Leitao, 1943: 111. Tipo ♂ 15740, Argentina: Mendoza: Diamante. II-1940, M. Birabén leg.

unguiculata, Alopecosa Mello-Leitao,1944: 339. Tipo ♀ 16020, Argentina: Buenos Aires: General Guido. II-1941, M. Birabén leg.

Observaciones: La localidad de la etiqueta difiere de la localidad tipo publicada: Buenos Aires, Tigre, Guayracá.

unguiculatus, Xenoctenus Mello-Leitao, 1938: 101. Tipo ♀ 14093, Argentina: San Luis: Desaguadero. Sin fecha, C. Bruch leg.

uniformis, Zelotes Mello-Leitao, 1941b: 220. Tipo ♂ 15250, Argentina: Santa Fe: Malabrigo. XI-1939, M. Birabén leg.

ursinus, Menemerus Mello-Leitao, 1945: 288. Tipo ♀ 16800, Argentina: Misiones: puerto Victoria. V-1941, Zenzes leg.

variabilis, Avitus Mello-Leitão, 1945: 276. 2 ♀ sintipos 16700, Argentina: Misiones: puerto Victoria. V-1941, Zenzes leg.

OBSERVACIONES: De una de las hembras sólo se conserva el epigino y restos del abdomen, y de la otra faltan algunos apéndices y se encuentra en deficiente estado de conservación.

variegatus, Coptoprepes Mello-Leitao, 1940a: 60. Tipo d 14410, Argentina: Chubut: Comodoro Rivadavia. II-1938, M. Birabén leg.

OBSERVACIONES: Se encontró un macho sin palpos en la colección Birabén, etiquetado como "paratipo", de la misma procedencia. El autor no designó paratipos.

variegatus, Misumenoides Mello-Leitão, 1941b: 218. 2 ♂ sintipos 15229, Argentina: Santa Fe: Reconquista. XI-1939, M. Birabén leg.

variegatus, Saitis Mello-Leitao, 1941a: 185. Tipo

♀ 14984, Argentina: Córdoba: Alta Gracia. Sin fecha, C. Bruch leg.

variolosa, Lycosa Mello-Leitao, 1941a: 134. Tipo ♀ 14702, Argentina: Córdoba: Villa Nueva. XI-1939, A. Parko leg.

vestita, Achalaicola Mello-Leitao, 1943: 113. Tipo $\ ^\circ$ 15775, Argentina: Córdoba: pampa de Achala. II-1940, M. Birabén leg.

viridisternis, *Peucetia* Mello-Leitão, 1945: 255. Tipo ♀ 16530, Argentina: Corrientes: Goya. XI-1941, M. Birabén leg.

vittata, Gnatholycosa Mello-Leitao, 1945: 249. Tipo ♀ 16500, Argentina: Entre Ríos: puerto Constanza. XI-1941, M. Birabén leg.

vittatus, Poíybetes Mello-Leitão, 1938: 110. Tipo ♀ 14161, Argentina: Buenos Aires: Monte Veloz. VI-1937, Bruch leg.

xanthomela, Castianeira Mello-Leitao, 1941b: 221. Tipo ♀ 15262, Argentina: Santa Fe: Silva. XI-1939, M. Birabén leg.

xanthomela, Gytha Mello-Leitáo, 1945: 257. Tipo ♀ 16560, Argentina: Entre Ríos: El Palmar. XI-1941, M. Birabén leg.

yacuiensis, Argyrodes González y Castro, 1996: 134. Holotipo♀ 17178, Argentina: Misiones: arroyo Yacuí y ruta 101, Parque Nacional Iguazú.

zenzesi, Hyptiotes Mello-Leitao, 1945: 229. Tipo of 16335, Argentina: Misiones: puerto Victoria. III-1941, Zenzes leg.

zenzesi, Teudis Mello-Leitao, 1945: 264. 2 d' probablemente sintipos 16605, Argentina: Misiones: puerto Victoria. IV-1941, Zenzes leg. Observaciones: Hay dos tubos de la misma procedencia, ambos etiquetados como "typus", y contienen un macho cada uno. Uno de ellos lleva el número 16605.

zenzesi, Uloborus Mello-Leitao, 1945: 231. 2 ♂ sintipos subadultos 16340, Argentina: Misiones: puerto Victoria. 111-1941, Zenzes, leg.

Observaciones: Publicado como hembra, aunque no hay descripción de alguna estructura que

indique sexo.

zorodes, Lycosa Mello-Leitáo, 1942: 395. Tipo 3 15340, Argentina: Chaco: Corzuela. XI-1939, M. Birabén leg.

El siguiente listado corresponde a alotipos no designados en la publicaciones originales de las respectivas especies

bivittata, Lycosa Mello-Leitáo, 1939.

Observaciones: Alotipo o 16680, Argentina: Córdoba: Tío Pujio. I-1939, M. Birabén leg. Designado por Mello-Leitao (1941a: 125), no pertenece a la serie típica.

fornicata, Mangora (Keyserling, 1863).

Observaciones: Alotipo of 14793, Argentina: Salta: Coronel Moldes. 111-1939, M. Birabén leg. Designado por Mello-Leitáo (1941a: 150), no pertenece a la serie típica.

mollis, Ariadna (Holmberg, 1876).

Observaciones: Alotipo d' 15900, Argentina: Buenos Aires: La Plata. IV-1940, M. Birabén leg. Designado por Mello-Leitáo (1944: 322), no pertenece a la serie típica.

obnuptus, Poiybetes Simon, 1896.

Observaciones: Alotipo of 16620 (tipo de *Polybetes cancroides* Mello-Leitao, 1945). Designado por Gerschman y Schiapelli (1965: 325), no pertenece a la serie típica.

ornatus, Loxosceles Mello-Leitao, 1938.

Observaciones: Alotipo of 14618, Argentina: Córdoba: Cabana. I-1939, M. Birabén leg. Designado por Mello-Leitáo (1941a: 107), no pertenece 3 la serie típica.

pallidus, Poiybetes Mello-Leitao, 1941.

Observaciones: alotipo of (en el mismo lote de las hembras sintipos), designado por Gerschman y Schiapelli (1965).

wasmanniae, Gammasomorpba Mello-Leitao, 1939.

Observaciones: Alotipo d' 0150, Argentina: Córdoba: Cabana. VII-1948, M. Birabén leg. Designado por Birabén (1954: 198), no pertenece a la

serie típica.

weijemberghi, Weyenberghia (Thorell, 1894) Observaciones: Alotipo ♀ 14606, Argentina: Córdoba: Cabana. I-1939, M. Birabén leg. Designado por Mello-Leitáo (1941a: 103), no pertenece a la serie típica. La localidad de la etiqueta difiere de la localidad publicada: Cruz del Eie.

Agradecimientos

María Elena Galiano aportó muchos y valiosos datos sobre tipos de Salticidae, y sobre la organización general de la colección, revisando una v otra vez sus anotaciones personales. Otros datos sobre tipos fueron obtenidos de los especialistas Norman Platnick v Kefyn Catley (American Museum of Natural History, New York), Herbert Levi (Museum of Comparative Zoology, Harvard), Miguel Simó (Facultad de Ciencias, Montevideo), Adriano Kury (Museu Nacional, Rio de Janeiro) y Rudy Jocqué (Musée Royal de l' Afrique Centrale, Tervuren). Alessandro Minelli (Univ. di Padova) y Axel Bachmann (Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires) aportaron valiosos datos y conseios sobre temas de nomenclatura. Dos árbitros anónimos revisaron exhaustivamente el manuscrito y aportaron valiosas correcciones y sugerencias que mejoraron notablemente este trabajo y Paulina Hernández corrigió con gran esmero y dedicación las pruebas de galera. A todos ellos estamos profundamente agradecidos; los errores y omisiones son nuestros.

Bibliografía citada

Arrozpide, R., 1986. Catálogo de tipos de Arachnida (Araneae) del Museo de La Plata. Ser. Téc. Didáct. Mus. La Plata 12: 63 p.

Birabén, M., 1946. Nueva "Mastophora" de Tucumán (Arachn. Argiop.) *Acta Zool. Lilloana, 3:* 327-330.

Birabén, M., 1951. Dos especies nuevas del género Bruchnops Mello-Leitáo, Rev. Soc. ent. Argentina, 15: 57-64

Birabén, M., 1954a. Nuevo género de la rara familia "Prodidomidae". *Neotrópica*, 1 (1): 13-16.

Birabén, M., 1954b. Nueva especie de *Nops* (Araneae-Caponiidae). *Neotrópica*, 1 (3): 43-44.

Birabén, M., 1954c. Nuevas "Gamasomorphinae" de la Argentina (Araneae, Oonopidae). *Notas Mus. La Plata*, 17 (*Zool*. 152): 181-212.

Birabén, M., 1955a. Dos nuevos oonopidos de la Argen-

- tina. Neotrópica, 1 (5): 73-76.
- Birabén, M., 1955b. Dos thomisidos nuevos de Bolivia (Araneae). Misión de Est. Patolog. Reg. Arg., 26(85-86): 73-77.
- Rrescovit, A. D., 1992. Revisão do grupo *prospera* do genero *Aysha* Keyzerling na região neotropical (Araneae: Anyphaenidae). *Theringlu*, *Zool.*, (72): 23-104.
- Galiano, M. E., 1980. Catálogo de los especírnenes típicos de Salticidae (Araneae) descriptos por Cándido F. de Mello-Leitão, Primera parte. Physis (Buenos Aires) Sec. C, 39 (96): 31-40.
- Galiano, M. E., 1981. Catálogo de los especímenes típicos de Salticidae (Araneae) descriptos por Cándido F. de Mello-Leitão, Segunda parte. Physis (Buenos Aires) Sec. C, 39 (97): 11-17.
- Gerschrnan De Pikelin, R. S. y R. D. Schiapelli. 1965. El género *Polybetes* Simon, 1897, en la Argentina. *Revta*. *Mus. Arg. Cien. Nat.* (Entornol.), 1 (5): 313-339.
- Gonzalez, A., 1987. Una nueva especie del género *Steatoda* Sundevall (Araneae, Theridiidae). *Revta. Soc. ent. Arg.* 44 (2): 179-183.
- Gonzalez, A. y D. Castro. 1996. Neotropical spiders of the genus *Argyrodes* Simon (Araneae, Theridiidae). *Bull. Br. arachnol.* Soc., 10 (4): 127-137.
- Ibarra Grasso, A., 1954. Una nueva Acanthoscurria de Bolivia. Neotropica 1 (2): 19-22.
- Jocqué, R., 1988. An updating of the genus Leprolochus (Araneae: Zodariidae). Stud. Neotrop. Fauna Environm. 23 (2): 77-87.
- Levi, H. W., 1995. The Neotropical orb-weaber genus Metazygia (Araneae: Araneidae) Bull. Mus. Comp. Zool. 154 (2): 63-151.
- Mello-Leitão, C., 1938. Algunas arañas nuevas de la Ar-

- gentina. Rev. Mus. La Plata (N.S.) Zool., 1 (4): 89-118.
- Mello-Leitão, C., 1940a. Arañas de la provincia de Buenos Aires y de las Gobernaciones de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Rev. Mus. La Plata (N.S.) Zvol. 2 (9): 3-62, 1 pl.
- Mello-Leitão, C., 1940b. Tres géneros extraños de arañas argentinas. Notas Mus. La Plata, Zool. 5 (43): 251-258
- Mello-Leitiio, C., 1941a. las arañas de Córdoba, la Rioja, Cataniarca, Tucumán. Salta y Jujuy. Reo. Mus. La Plata (N. S.) Zool. 2 (12): 99-198, 12 Ims.
- Mello-Leitão, C., 1941b. Arañas de la provincia de Santa Fe. Rev. Mus. La Plata (N. S.)Zool. 2 (13): 199-225.
- Mello-Leitão, C., 1942. Arañas del Chaco y Santiago del Estero. *Rev. Mus La Plata (N.S.) Zool.* 2 (16): 381-426.
- Mello-Leitiio, C., 1943. Arañas nuevas cle Mendoza, La Kioja y Córdoba, colectadas por el profesor Max Birabén. Rev. Mus. La Plata (N. S.) Zool. 3 (20): 101-121.
- Mello-Leitáo, C., 1944. Arañas de la provincia de Buenos Aires. Rev. Mus. La Plata (N. S.) Zool. 3 (24): 311-393.
- Mello-Leitão, C. 1945. Arañas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Rev. Mus. La Plata (N. S.) Zool. 4 (29): 213-302.
- Mello-Leitão, C., 1946. Arañas del Paraguay. Notas Mus. La Plata 11 (Zool. 91): 17-50.
- Platnick, N. I., 1986. A revision of the spider genus Trochanteria (Araneae, Gnaphosoidea). Bull. Br. arachnol. 7: 29-33.
- Prosen, A. F., 1949. Nops farhati sp. n. (Araneae, Caponiidae). Anales Inst. Med. Reg. Univ.Nac. Tucumán, 2 (3): 321-323.